


育苗箱

幼苗移出田間綠化與硬化時，宜選擇日光充足，通風良好，灌排水及搬運方便地點。排放如改良式苗床，寬一·二公尺（四台尺），每床間留寬三〇公分，深九公分（三台寸）作為灌排水溝。不論苗床長短，每隔六〇公分各撐一竹片長一·六五公尺，寬二公尺之彎曲竹片，在苗床兩邊插入土內。並在彎竹片中央部分，用桂竹片綁住（如右圖）。

綠化育苗

竹架全部綁完以後，用青色塑膠網（寬二公尺、長八公尺）蓋好，以繩子綁住竹架兩邊，其上加蓋透明塑膠布（厚〇·〇五~〇·一公尺，寬二·〇六公尺，長八公尺），但塑膠布兩邊各留九公分，用電烙粘着，作成圓筒形，並用桂竹穿入蓋住苗床塑膠網上部。第二期作可免用塑膠布，僅用塑膠網，避免日晒及溫度上升。



田間綠化設置

農機標準名詞對照表

名稱	英文	日文
洩（漏）氣	Air leakage	空氣もれ
氣泡式抽水機	Air life pump	氣泡ポンプ
通氣孔	Airport	空氣口
空氣阻力	Air resistance	空氣抵抗
洩氣孔	Air vent	空氣孔

育苗管理

濕田育苗：若用濕田育苗，排水要良好，使保持適當水分。苗床溫度超過攝氏三〇度時，要把覆蓋塑膠布打開，避免溫度及濕度上升，以防止秧苗徒長及病害。

旱田育苗：旱田育苗容易發生水分不足，須每天上、下午各灌水一次，苗床溫度也不得超過攝氏三〇度。水泥晒場育苗：水分蒸發快，每天灌水三次，保持適當水分，以免因缺水而秧苗枯死。

育苗期間要噴酒立枯靈八〇〇〇、一〇〇〇倍或施美濃一、五〇〇〇、二〇〇〇倍二、三次，預防苗腐敗病、立枯病、白絹病，本預防工作若在床土準備期間噴洒一次效果更好。

對預防浮塵子、螟虫，可用賽文與依必安或馬拉松各一、〇〇〇倍防治一、二次。



拉草乳劑除雜草  
雜糧蔬菜慶豐收

大豆田·花生田·蔬菜園·菓園  
最新初期用選擇性除草劑

- 美國孟山都公司出品的拉草乳劑，適用於大豆田及花生田外，也適用於各種蔬菜和菓園。
- 拉草乳劑可消除各種雜草：牛筋草、麵線草、稗仔、莧類、苦柱仔、無頭香、狗尿菜、頂目草、炮仔草和豬母乳。且不傷害作物。
- 拉草乳劑應在作物和雜草萌芽前施用。
- 拉草乳劑施用於土表，可保持藥效達30天以上。

乳劑

拉草

農用除草劑

Monsanto  
孟山都

美國孟山都公司台灣分公司  
台北市長安東路一段36號六樓  
總經銷：  
大勝化學工業股份有限公司  
台北市南京東路一段48號