宜蘭養淡水魚

〔問〕：宜蘭地區養殖何種淡水魚較好？

㈡魚被針虫、魚虱寄生後，有何病狀？如何判定？如何預防及治療？

㈢水黴病及鰓病如何預防？

㈣聽說溫度低時，使用「甲基藍NFC二〇」無效是否確實？

㈤孔雀綠藥性如何？對何種病虫害最有效？

㈥魚類下痢病徵如何？要怎樣預防？

㈦「泰滅淨」藥性如何？對於何種病最有效？

㈧魚在出售前，用何種方法能促進肥大？

㈨鰻完全餌料（乾）如何調配？

㈩聽說麵粉混合雜魚給鰻吃，鰻易生病是否眞的？（宜蘭員山鄉尙德村二十鄰四二號陳阿老）

〔答〕：㈠改良種吳郭魚、鰻魚、塘虱魚、錦鯉、鯰等。

㈡魚體表附着長二—三公分寄生虫，卽爲針虫。直徑約〇・五公分的圓型虫爲魚虱，使用BHC及地特松驅除。

㈢水黴病—使用泰滅淨，每頓魚一日投藥二〇〇公克，連投七—一〇日。

鰓病—使用NF上野C二〇，以三〇〇坪水深一公尺算，投一〇公斤，三—四日後再投一次。

㈣沒有這回事，本省的氣溫均能使用，約十日後有效。

㈤毒性激烈，小心使用。雌鰻線不宜使用該藥劑，但對水黴病有效。

㈥可用V富卵，按飼料量的〇・二%投給。

㈦不宜連續投給，卽投七—一〇日，對赤鰭病、鰓病有效。

㈧有效餌並注意池水管理。

㈨目前各工廠的配方均不同，一般大致如下：

魚粉	六五%
魚精粉	五・三六%
脫脂大豆	一〇・一六%
澱粉	八・一二%
酵母粉	一〇・一六%
混合維他命	一%
粘結劑	〇・二%
抗氧化劑	〇・二%
L-Lysine	〇・二%

㈩過量才有影响。（鄧火土）

千年桐栽培有利

〔問〕：(1)油桐在北部地區可否種植？

(2)油桐種多久，才能採收果實？

(3)油桐種子何處有售？

(4)買種子（果實）自己播種，是否比買種苗要經濟？（台北市重慶北路二段四六巷三號林偉章）

〔答〕：㈠北部地區可以種油桐，但應選土壤肥沃，避風之地，生育才能良好。

㈡油桐有兩種：一爲採果實爲主的三年桐（又名光桐、漢口種），二爲以收穫木材爲主的千年桐（又名鐵桐、廣東油桐）。依照目前及將來市場趨勢看來，應種植千年桐比較有利。至於三年桐，由於桐油銷路及價格不穩，不宜多種。

千年桐種後八～十年可收木材。

㈢如需要千年桐苗木，可向貴地縣政府林務課申請免費分配，種子則請逕向種苗商採購。

㈣油桐造林，直接播種或種植苗木均可。直接播種可節省育苗費用，但需較多的刈草撫育經費，在本省一般多採用苗木造林。（林文鎭）

韮黃栽培

〔問〕：韮黃如何播種、分株、施肥、灌溉？（花蓮市軒轅路三〇巷四號周治秋）

〔答〕：韮黃是韮菜的軟化栽培。韮菜可以分株，也可以播種的方式繁殖，在東部除七、八月（因爲颱風）外，隨時可以下種或種植。

韮菜爲多年生作物，所以肥料以堆肥爲主，化肥爲副。一般種植後半年就可採收，但軟化栽培須利用滿一年生者爲對象，將韮菜刈除，立卽立架並用草蓆（二層）覆蓋，以免光線透進，以利軟化。

一次軟化栽培後，必須繼續收穫三次，培育地下莖後再度作韮黃，否則會引起根部腐爛。

作韮黃之前，必須培育地下莖，才有良好的收穫，所以沒有人專門栽培韮黃。因此韮菜栽培就是韮黃栽培的大半，施肥灌溉等管理方法，均按韮菜栽培實施。（王進生）

帆　船　牌

國營台灣碱業公司新產品

菇舍竹器木材防腐、病虫害蝸牛驅除、菇舍雞舍消毒

百　效（五氯酚鈉）

說明書及資料備索

全省總代銷：禾本企業行

高雄市中山一路一二四號

電話：2376683

8　0　0