



農業信箱

草魚主食青草

〔問〕：(一)魚池水是綠色的或赤紅色的，對於草魚、鯽魚有何影響？
 (二)不定時投給草料餵飼可以嗎？
 (三)草魚吃草好，還是豬糞經日晒發酵生虫後投入好呢？

〔答〕：(一)一分地魚塢，現有八寸的草魚四百尾、鯽魚四百尾、(三寸)庚仔魚四百尾、(二寸)、非洲魚一千尾，上有二百二十隻鴨，十五隻豬的糞尿，如全部投入魚池可以嗎？
 (二)魚池中有綠色藻類植物，會影響鯽魚生長嗎？

〔答〕：(一)混養草魚一百尾、非洲魚一千尾，水深約二尺，投入發酵或未發酵豬糞可以嗎？(彰化伸港鄉定興村七七號黃桂森)

〔答〕：(一)池水綠色為植物性浮游生物的藍、綠、硅藻等發生多。如赤紅色為動物性浮游生物發生多，但草魚主食草類，鯽魚主食為植物性浮游生物，所以綠色池水對鯽魚有好處，赤紅色池水對草、鯽魚均不理想。
 (二)草魚每日給適量草類為最理想，如有吃不完的草類沉在池底腐爛，會影響池水質變壞。

(三)草魚主食為草類，因此給予青草最好。豬糞多當作肥料，對草魚不適宜。

〔問〕：(一)飼養草魚是否可以用樹薯葉做飼料？
 (二)草魚的死亡有那幾種？
 (三)池水是否須定期更換？
 (四)養草魚應注意什麼？(埔里鎮中正路四七三號王瑞明)

〔答〕：(一)按所說情形豬糞可能過多，冬春天溫度低還不至於水質變壞。夏天溫度高時，鴨豬糞等肥料分解反應迅速，植物性浮游生物發生多，夜晚停止光合作用，水中缺乏氧氣，魚可能會死亡。
 此時可以測定透明度來決定施肥量，透明度自三十至四十公分之間，池魚不會泛池，生長又快。如在三十公分以下，可說過肥須停止施肥。如在四十公分以上，池水肥分不足，應繼續施用雞豬糞。總之，能保持透明度三十至四十公分者，施肥量才為適當。

〔答〕：(二)草魚的死亡因有那幾種？
 (一)草魚的死亡因有那幾種？
 (二)草魚的死亡因有那幾種？
 (三)池水是否須定期更換？
 (四)養草魚應注意什麼？(埔里鎮中正路四七三號王瑞明)

草魚死亡原因

〔問〕：(一)飼養草魚是否可以用樹薯葉做飼料？
 (二)草魚的死亡有那幾種？
 (三)池水是否須定期更換？
 (四)養草魚應注意什麼？(埔里鎮中正路四七三號王瑞明)

〔答〕：(一)草魚的死亡因有那幾種？
 (二)草魚的死亡因有那幾種？
 (三)池水是否須定期更換？
 (四)養草魚應注意什麼？(埔里鎮中正路四七三號王瑞明)

〔答〕：(一)草魚的死亡因有那幾種？
 (二)草魚的死亡因有那幾種？
 (三)池水是否須定期更換？
 (四)養草魚應注意什麼？(埔里鎮中正路四七三號王瑞明)

(4)細菌及寄生虫所引起的疾病。
 (三)飼養草魚水流最好暢通。
 (四)一般飼養草魚多以清水，肥水不適於草魚飼養。

〔問〕：(一)紅蘿蔔是否適合台灣種植？下種日期、施肥、管理如何？(花蓮市軒轅路三〇巷四號周洽秋)

紅蘿蔔栽培

〔答〕：(一)紅蘿蔔正名為櫻桃蘿蔔，播種期為九月、十二月及三月、四月(一、二月會抽苔)。紅蘿蔔的消費量有限，不宜作大面積栽培，而且

因生育日數短(二十四天左右)，須分期播種。每分地播種量如下：
 條播 二·五~三公斤
 撒播 四·二~五公斤
 品種以Cherry Belle 或 Spar-Ker 兩種較宜。

〔問〕：(一)紅蘿蔔是否適合台灣種植？下種日期、施肥、管理如何？(花蓮市軒轅路三〇巷四號周洽秋)

〔答〕：(一)紅蘿蔔正名為櫻桃蘿蔔，播種期為九月、十二月及三月、四月(一、二月會抽苔)。紅蘿蔔的消費量有限，不宜作大面積栽培，而且

以最優良的種子、最合理的價格，供應辛勞的農友們 (價目表函索即寄)

台灣農產企業股份有限公司 台北市迪化街一段86號

●黃肉小玉西瓜的代表種：黃鸞小玉西瓜

在全省各地已風行栽培，無論產量、肉質、甜味均勝過其他各種小玉、小鳳西瓜。(請認明彩色原封銜裝，每箱30公分、一分地用70元)

●農友們最愛種的紅心人參——八江新黑田五寸人參

最豐產，肉色最鮮紅人參，在市場上隨時以最好價格出售。

●最受市場歡迎的青皮香瓜——虎標南都早生ニゴメロン

比較其他ニゴメロン更早生、生育旺盛、栽培容易、成熟日比一般品種早七十天，果實整齊、果肉乳白、香味濃、糖度高。