

稻田用催乾劑 降低收穫成本

以化學乾燥劑催乾稻葉，可以降低稻谷收穫的費用。稻穗已經成熟但稻葉仍然青綠，不管應用機械或人工都增加了收穫的困難。

利用利谷農 (Reglone) 之類的化學藥劑催乾稻葉，可以讓農民收穫得更快，降低收割及稻谷乾燥的成本。

Diquat 在接觸青葉後，三、四天內便很快乾燥。遺留在地上的藥劑，對於下一季作物絕無殘毒影響。

稻葉催乾處理後的稻谷含水量比未處理區者降低得更快，所以能夠迅速曬乾，因此降低了晒谷成本。

催乾劑對稻粒發芽率的影响不大。米谷碾磨時，可以除去所有殘餘催乾劑，不致影响人類健康。未脫粒稻谷餵養家畜也很安全。

稻田可在稻穗成熟時噴藥，甚至在部分「乳熟」時也可以噴藥。通常以空中噴施的效果最好，一般在噴施三、十天後收穫。

——啟敏譯自 World Farming


煤氣管漏氣 錦靜鳥先知

錦靜鳥原產澳洲。抗病力很弱。民國五十四年本省養鳥發達到最高潮時，鳥販乘機操縱，每對錦靜鳥開價萬元。那一年的秋，天鳥價就慘跌了。

錦靜鳥如果變換環境，生病

死亡的比率特別高，因此鳥箱不要輕易移動。

此鳥大概可分為長尾、紅嘴、黃嘴、黑嘴等四種。產卵率高，又可以由十姊妹當假母去抱卵和育雛。所以，比其他洋鳥的繁殖容易，通常，八月下旬開始產卵飼料，九月十月間就開始產卵。飼育法與胡錦鳥大體相同。剛孵化的雛鳥，全身灰色，雛毛稍長，幼鳥羽色與母鳥相似。冬季怕冷，要設法保溫。雌雄的區別困難。發情時雌雄叫聲



錦靜鳥 Grass finch

都極相似，不過詳細觀察的話，雄鳥嘴色較濃，喉部黑羽也較大，有經驗的可以辨別。

發情期間，往往因築巢意見不一致，雌雄發生爭鬥。如在繁殖箱內左右兩邊各放一巢，便可以解決，以免影响產卵。

目前鳥商收購價格是一對一六〇元。錦靜鳥對於毒性瓦斯極為敏感，如果廚房內煤氣洩漏，錦靜鳥立刻就有反應。

吳學章取材「愛鳥之友」

水田害魚 兼食雜草

日本埼玉縣羽生市發現一種食害稻葉的黃鯛魚。據當地農家說，五年前，在低窪地區積水較深的水田，長出水面的稻葉，時常遭受某種動物的食害。後來發現，在水田裡生息的黃鯛魚數激增，同時水稻被害情形也增大，甚至有整塊稻田被吃光的。

黃鯛魚 (ワタカ) 屬於鯉科，長至約一〇公分大時，頗似香魚。長成後約二五公分，又似鱸魚的形狀。每年六、七月間，游至淺水雜草處產卵。

這種魚雜食性，通常以水草的新嫩葉為主食，解剖消化器管檢視，內容全部綠色。

黃鯛魚雖可供食用，惟因骨硬且多小硬刺，食味又不很好，當地居民都不喜歡捕食。這種魚原為日本琵琶湖、淀川流域的特產，後來隨着鮎魚苗流出，才傳布到其他地區。水田中的黃鯛魚，時常飛躍出水面上，所以有人叫它做飛魚。

黃鯛魚生息的水田，水質污濁。由於它以草類為食物，所以雜草不生。長出水面二〇多公分的稻葉，黃鯛魚可以飛離水面，以銳利的牙齒將稻葉齧斷。結果被害稻根基腐敗成爲缺株，最後整塊水稻全枯死。

黃鯛魚雖然爲害水稻，但有吃雜草的習性，而且食量很大，也許可利用來防治水生雜草。

——黃添盛取材「植物防疫」

優選

天理 交配

新種

大和農園產品

(長岡交配各品種等現貨供應)

1973年 新子介紹

獨家進口 三季蔘霸王白菜

黑葉大型煙台力包心有白本品種在種植不過
二、三年，但暑其品質，實屬獨特，已風評全省、被深斤家
最信譽，耐寒、抗病、最宜後場，每兩
、食味俱佳，耐抽苔，收成後，持
左右，保持十成收穫，原裝
所賞識之新品種，均有售。

金力甘藍 一代交配種，耐暑、抗病、抗旱等極強，
最適合本省氣候，四季栽種，育苗25日定植後55~60日
可收成，質甜嫩柔，每球重二公斤左右，在多年歷
史，爲一致讚譽品種。(原封包三兩裝每包兩90元)
草花種子 (新進口、發芽好，精美繪袋裝50餘種)

ニユーメロン香瓜 原裝新進口，早生綠皮，品種
純正可靠，結球多，味香甜度高。

黃金金城甜瓜・黃金九號甜瓜
小玉西瓜 一代交配，絲皮，黑花紋，肉鮮黃子少
甘味，甜度高，每粒2公受歡迎，最據聲譽，西瓜品系
之冠，比之其他品種好。世界公認好瓜。

巨豐菠菜・ミカサ菠菜 本品種生長快可在八月
至三、四月間隨時播種，比其他品種產量高數倍。(高
冷地區夏作佳種) (以上各品種均精美繪袋包裝原
封進口)

新裕興企業股份有限公司
新合成種子行
台北市迪化街一段一四九號
台灣郵政劃撥：502號 TEL：543787