

標準的六、六〇〇公卡，可能是多剩餘一成。

經產豬雖然不必供給母體自身發育的分量，但是因為體身大，維持分量需要多，因此相抵結果，與新母豬同樣，一天需給以六、六〇〇公卡。

依照日本神奈川縣澁谷試驗所的試驗，妊娠期給與量二公卡（六、六〇〇公卡）與三公卡（九、三〇〇公卡）的比較試驗結果看來，繁殖成績並無多大差異，只是分娩間隔，二公卡試驗較短而已。

又五、二〇〇公卡與三、五〇〇公卡（TDN八〇飼料，日量一・五公卡與一公卡）比較試驗結果，五、二〇〇公卡（一・五公卡）試驗有隨着產次而增加若干體重的現象，繁殖成績正常。

但是三、五〇〇公卡（一公卡）試驗，雖然產次增加，惟體重全無增加。

給與適量效率高

總之，要使種母豬體的消耗少，攝取營養的利用效率高，繁殖成績正常，且無難產、流產、死產或產後的發熱、泌乳停止等毛病，安全的給與量是，妊娠期日量一・八二公卡。授乳期日量五・六公卡（或不斷給與），這樣才能富有產性，增長繁殖年限。

對此程度的營養量，經產豬到了近分娩期的體重大概二五〇公卡，在妊娠中所增加的體重約三〇公卡，因為分娩約減二〇公卡，授乳再減一〇公卡，或全無減重的狀態下看來似為中肉豬，身軀，不會壓死仔豬。這是

以生產仔豬為目的的種母豬最適當飼養方法。

以上所述，種母豬的飼料給與標準，非我個人或試驗改良機關的意見，而是國際最具權威的NRC、ARC學者的總結論，很值得供養豬農友做參考。

除此營養的調節外，提高種母豬連產性與增長繁殖年限，在管理上的要點為：

育成期充分運動


(1) 育成期使有充分的運動，於初產分娩前盡量在廣闊的放牧場飼養。

(2) 經產豬舍飼並無不可，但如果環境無問題，亦以放牧較好。

(3) 肢蹄不健全的母豬要盡早淘汰。

(4) 充分育成更新用候補母豬，於編入新母豬時必須嚴格選擇。

(5) 新母豬的配種，要以生後十個月體重一一〇～一二〇公卡為目標。（台南區農業改良場提供）



單位：公分

——小豬飼料槽（洪嘉漢）

花生田・大豆田 蔬菜園・果園請用：

農藥登記證北市農藥字第0489號 乳劑

拉草

農用除草劑

Monsanto®
孟山都



- 拉草乳劑可消除各種雜草：牛筋草、麵線草、稗仔、莧類、苦柱仔、無頭香、狗尿菜、頂目草、炮仔草、豬母乳等。且不傷害作物。
- 拉草乳劑應在作物和雜草萌芽前施用，效果持久，省時省力。
- 拉草乳劑，灌溉後土面濕潤時施用效果特佳。

美國孟山都公司台灣分公司

台北市長安東路一段36號六樓

總經銷：南億企業股份有限公司

彰化縣鹿港鎮埔崙里埔脚巷43號