




玉米筍 (張新吉)

(2) 中耕除草

中耕勿過深，以免切斷根部。玉米生育期間如遇降雨，應行中耕，增加土壤水分的滲透。中耕除草及培土適時舉行二、三次，至最後追肥應停止中耕。

(3) 灌溉排水

玉米各生育時期，對水分需要有不顯著的差異。生育初期應保持適當的水分。中期需更多的水分。開花期所需水分最多而最重要，如果缺乏水分，對產量影響很大。初、中期缺乏水分(不致枯萎)，至開花期水分供給充分，對產量影響不大。抽穗前灌溉一次，其前後各又灌溉一次，共分三次最為經濟而有效。但在初期(幼苗期)應注意排水。

(4) 除藥

土壤肥沃而水分充足時，玉米生育旺盛，從地面兩邊常會發生分蘗。分蘗有無去除，對產量並無影響。

(5) 收穫

果穗包皮枯白，子粒堅硬，用指甲壓而無汁液滲出時，為收穫適期。收穫後果穗晒五、七天，然後利用小型脫粒機脫粒。

病蟲防治

(1) 露菌病

若發現病株，應即拔除。病區應栽培「台南一號」，且玉米不可與甘蔗間作。

(2) 煤紋病、銹病、葉斑病

發生時用「大生M二二」四百倍加展着劑防治，可減輕病害。

(3) 玉米螟

- (1) 生育初期視發生情形，噴射四五%「依必安」乳劑一、〇〇〇倍稀釋液一次，每公頃每次用藥量〇・八—一公升。
- (2) 玉米雄花抽穗前一〇—一五天，噴射四五%「依必安」一、〇〇〇倍稀釋液，每公頃每次用藥量一—一・二公升。
- (3) 雄花抽穗時，拔除有虫孔之穗，但不得超過全穗的二分之一，以免影響授粉。
- (4) 雌花抽穗後約一〇天，噴射五〇%「賽文」可濕性粉劑五〇〇倍稀釋液，每公頃每次用藥量二・四—二・八公升。

(4) 大螟

大螟是水稻與玉米共同的虫害，為免水稻留下害虫為害玉米，基肥應混合「飛布達」，每公頃一五公升。

好消息

劃時代農器具


中洲牌

萬能輕便犁田、碎土、除草機。

本TP₃₆型同一車台可做如下三種不同用途

TP₃₆型 犁田用

特點



- ① 操作簡單
- ② 重量非超常
- ③ 全過輕便
- ④ 碎土

TP₃₆型雙輪、花園、茶園、果園除草碎土用

特點



- ① 可前進後退
- ② 180°迴轉
- ③ 馬力4HP
- ④ 堅固耐用
- ⑤ 工作量大
- ⑥ 加培土

TP₃₆型單輪 菜溝、花溝、菸溝碎土及除草用

特點



- ① 口機要人可作
- ② 便便人可作
- ③ 在菸溝碎土及除草
- ④ 底底碎土及除草
- ⑤ 輕便

◎價格只有一條耕牛價格，效力勝過一條耕牛。

中洲行：台中市台中路230號
台中高農學校斜對面