




就因之(張成時)

化炭時，令自動着火補給，需要量充足後，即自動停止。(3)以強力噴射方式，攪拌室內的空氣，使室內每一角落的氣溫相同。(4)吊掛、定置兩用設計，裝置方便。  
——黃添盛取材「農耕與園藝」

### 養金絲雀經驗

• 建築鳥舍，要鳥的生產率高，須要有南北兩向的對開門窗。  
• 一隻發情良好的公鳥，每星期配種四天，每天交配兩隻母鳥。其餘時間須休息。  
• 母鳥在生產前四十八小時以後，最易受精。  
• 金絲雀在巢內或底盤上配種時，公鳥之尾部不便全力壓下，最好在棲木上交配。

### 二氧化碳

#### 自動供給


日本的一家農業器材公司新近製成實用二氧化碳自動補給器。經園藝生產研究所試驗結果，只要每天早晨補給溫室胡瓜兩小時的二氧化碳(五十六天)，即有促進生長、增加產量及提早收穫的功効。

這種自動補給器的特點：(1)所用燃料可以完全燃燒，不會排出有害氣體。(2)在作物需要二氧

• 爲了防止鳥卵中止發育，生下後不超過五天就要孵抱。孵抱中的母鳥，在夏天離巢如超過二小時，冬天一小時，也會變成中止鳥卵。  
• 養母鳥五十箱大約要四、五坪的面積。每天管理時間約需二、三小時。公鳥最好準備約二十五箱，輪流使用。  
• 種公鳥選擇標準：體型壯碩修長，双目明亮，羽毛豐潤緊密。腳長爪粗，胸肌肉結實。鳴聲高亮，交配欲強。  
• 種母鳥選擇標準：體型大而略呈圓形，但不是肥胖鳥。握

在手裡很溫馴，結實，體重充足。羽色有光澤，食欲旺盛。屁股紅潤寬大扁平者最爲理想。注意不要近親配種。

• 母鳥有「覆」比無覆好，斑色鳥比純色者好。初養者，應該直接到養鳥戶去買，不要計較一些價錢，只要好鳥。  
——吳學章取材「愛鳥家之友」



金絲雀 Canary

### 水銀吸收劑

有機水銀劑種子消毒藥劑具有很高效率，缺點是慢性蓄積毒性，威脅人畜健康，引起環境污染。

日本農林省對於使用有機水銀劑，消毒種子後推廣一種專門吸收殘餘廢水中水銀的「水銀吸收劑」。

同時，也鼓勵廠商研究，開發非水銀劑系統的消毒藥劑。  
黃添盛取材「今月の農藥」

最新天然殺蟲劑 (北市農藥字第1085號)

**大寶** DIPEL<sup>®</sup>  
(HD-1型蘇力菌)

使用倍數：1,500—3,000倍

Abbott Laboratories  
美國雅培大藥廠出品

台灣總代理：  
華欣貿易有限公司  
台北市南京西路五十號  
TEL: 570708 • 570953

- 效力宏大持久
- 人畜植無毒害
- 極安定不變質
- 品質保證劃一
- 用量少最經濟

台灣總經銷：  
惠光貿易有限公司  
台南市東門路231號  
TEL: 24971