

蓖麻栽培要點

莊瀋瓊

(1) 播種期：東部地區八月中旬～下旬為適期。

南部地區八月下旬

九月上旬為適期。

北部地區九月中旬

下旬為適期。

(2) 播種量：每公頃需種子一〇~一二公斤。

(3) 行株距：行距一公尺，株距五〇~一〇〇公分。

(4) 播種法：

點播，平地以三角形播種，山坡沿等高線的角形種植，每穴播種二、三粒，各粒種子距離二~四公分，深為四~六公分，種後即用細土覆蓋。

(5) 施肥：每公頃的施肥量如下：

(1) 完全腐熟堆肥一萬~一萬五千公斤。

(2) 疏安二百公斤。

(3) 過磷酸石灰二五〇公斤。

(4) 氯化鉀五十公斤。

將分作兩次施用，第一次播種後四〇天配合中耕除草，進行施肥並培土。

以後相隔四〇天左右，再行第二次中耕除草、施肥並培土。

(6) 管理：蓖麻生育初期，必需管理周到，才能使植株生育良好，收量增加。

(1) 補播——蓖麻發芽齊齊後，如有缺株，即時補播。

(2) 間拔——苗高十五公分時即可間拔，每穴苗一株。

俟苗高一〇~三〇公分時再拔去。

一株，僅留一株。
(3) 中耕除草培土：
中耕除草能使土壤鬆軟，防止雜草蔓延，以免妨礙蓖麻生長。培土能使植株不易倒伏，蓖麻田排水良好。

(4) 整枝摘心：

蓖麻適時摘心，能使分枝數增加，成熟及收穫時期提早，還可抑制植株徒長。

摘心時注意下列數點：

① 土壤肥沃：

蓖麻生育旺盛，行株距過大，可

② 蓖麻生育徒長：

蓖麻生育常受雨季影響，植株有徒長現象，可行摘心。

③ 蓖麻摘心：

播種後四五天~六〇天以內於晴天時舉行。

④ 十月以後播植蓖麻：

切忌摘心，蓖麻植株無徒長現象或生育過於旺盛的情形，可以不必摘心。

⑤ 收穫適期：

蓖麻收穫以果穗為單位，一個果穗上蒴果若有三分之二以上成熟時，便是收穫適時期。

收穫過早，果穗頂端蒴果不易成熟，影響收量，降低品質。


收穫過遲，部分蒴果已自然裂開，種子散落，收量也會減少。

農友們！興農的優秀品種！只有無比的信譽！

美金・美金的新興農作物之一，
一甲地六十萬・利益最少有三十萬之多。

露地洋香瓜（內外銷通用）比西瓜高三倍以上之收益。
興農 106 號（果肉綠色）
興農 206 號（果肉綠黑色）

袋120元，一分地1,200株



品種，敝行
甜度都在12
度以上，最
高14~15度
，一分地
1,200株，
一株標準留
三棵至5棵
，整枝其餘
可除去，一
棵約1.6公
斤左右，平
常批發公斤
30~10元，最高
30元。

農友們一提到洋香瓜，都使人害怕，因常常甜度不好，而無人要，也
有很多栽培過的農友因選擇錯誤，以致外銷不行，內銷滯市，損失慘重。
農友們讓我們來互相研究，以改進技術，相信不久之將來洋香瓜必成
為賺外匯美金的農作物之一，共同來發展，使敝行有機會為您效一分力。

播種期：一月至二月，八月中旬至九月止。

黃肉品種洋香瓜・サンライズメロン・興農76號（比サンライズ安定
甜度）一袋100元，旭早生二号メロン原裝罐二斤200元。

總輸入・林興農行股份有限公司

三重市重新路三段108號

郵政劃撥四〇二八號

電話：九七二六三四

興農種子行

豐年第二三卷第三期