

林進益： 在台灣栽培

牡丹花



牡丹原產我國，栽培歷史甚久，一向尊稱為花之王，象徵榮華富貴，又名富貴花。牡丹為溫帶花卉，需經相當程度的低溫期，始能開花。花於五月間開於枝端，色黃、白、紅、紫、綠、青等，為數甚多，葉互生，根多肉，可供藥用。

牡丹栽培場所，宜日照良好，以盛夏不西晒之處為宜，如有遮蔭樹最好。牡丹性喜燥乾氣候，本省溫度濕度均過高，不甚適合種植牡丹。

冷涼氣候，對牡丹生長有益。冬季休眠期，最好有霜雪，連續在五度C以下一二個月，對開花之促進有所幫助。

因此，本省自日本引進的牡丹植株，需經低溫處理，否則不易開花。要在本省栽培牡丹，要選冬季有雪的高冷地。

土壤以沙質土或普通壤土為宜，排水不

良的粘質土壤應予避免，如在濕度高、雨水多之處，應以高畦栽植。

目前台灣的牡丹，多數引自日本。日本栽培品種相當多，園藝變種更是不計其數。

普通種：八千代

椿(桃色)、玉芙蓉

(淡桃色)、日照(

濃紅色)、太陽(鮮

紅色)、花大臣(紫

色)、初烏(黑紅色

)、月世界(白色)

、日月錦(洋紅、瓣

端有白紋)。

寒牡丹：春日山

(淡桃色)、雪重(

白色)、翠鳥(黑紅

色)、錦王(濃紅色)。

中國種：玉華(淡紫色、重瓣)、壽老

(粉紅)、紫上(紫色、重瓣)。

黃色種：金晃(濃黃色)、金鸚(黃色

、粉紅斑)、金閣(金黃、有粉紅斑)。

今年二月二十日至二十六日在台北市新

公園展出品種，計有：金閣、花王、七福神

、花景、太陽、田扇、連鶴、錦姬、大盃、

花司、島乙女、農神樂等。

苗木選擇

牡丹苗均經嫁接繁殖，砧木可用芍藥或牡丹，苗木選擇標準：

- ① 希望翌年春天開花時，應選具有花芽之植株。
- ② 幹莖粗，健壯有生氣。
- ③ 具有完全的粗根。
- ④ 接穗及砧木接合良好。
- ⑤ 無病健株。

接木繁殖

牡丹以接木方法繁殖，時期為九月上旬中旬。砧木普通用芍藥二年實生苗。接穗選充實新枝，長三分公，按二〇/三〇度之銳角切削，反面再予稍削。

接木採切接或割切法。嫁接完了之苗，栽於苗床上，用瓦鉢蓋覆，以防豪雨。但瓦鉢需於翌春發芽前除去；過遲則易趨軟弱，或發生徒長。

栽植方法

牡丹定植時期，以九月下旬至十月為宜，如在十一月以後定植，細根發生少，成績惡劣。如至春天定植，發育最差。

提早開花，用促成栽培，台灣可參考此法。於九月下旬至十月間，摘除舊葉，放在大型箱內，芽部用水苔(水分盡量擠出)包裹，放置〇/三度C冷藏庫中。

經三〇/四〇日取出，一/二株種一盆，盆徑三〇公分。上盆時注意保護新根，不可折曲或折斷。

農村家庭



(白銜理)

古書上的牡丹品種

益。

牡丹爲我國著名花卉，古書上記載的名稱很多，現在摘錄洛陽牡丹記、天彭牡丹譜及花鏡三種，即已美不勝收，園藝專家如將古今品種一一對照鑑定，諒可獲得許多寶貴資料。

1. 宋代歐陽修「洛陽牡丹記」中所錄，有下列品種。

姚黃、魏花、韋紅、細葉壽安、牛家黃、潛溪緋、左花、獻來紅、葉底紫。

鶴翎紅、添色紅、倒暈檀心、朱砂紅、九蕊真珠、延州紅、多葉紫。

粗葉壽安、丹州紅、蓮花萼、一百五、鹿昭花、甘草黃、一厭紅、玉板白。

2. 陸游「天彭牡丹譜」所載品種亦多。

紅花：獻元紅、祥雲、紹興春、燕脂樓、玉腰樓、金腰樓、富貴紅、一尺紅。

雙頭紅、鹿胎紅、文公紅、政和春、醉西施、迎日紅、彩霞、疊羅、勝疊羅、瑞露蟬、乾花、大千葉、小千葉。

紫花：紫繡毯、乾道紫、潑墨紫、葛中紫、福嚴紫。

黃花：禁苑黃、慶雲黃、青心黃、黃氣毯。

白花：玉樓子、劉師哥、玉覆盆。

鴉花：歐碧。
其他：轉枝紅、朝霞紅、洒金紅、瑞雲紅。

壽陽紅、深春毯、冰囊紅、福勝紅、油紅、青絲紅、紅鵝毛。

粉鵝毛、登金毯、間綠樓、銀絲樓、六對蟬、洛陽春、海芙蓉。

賦玉紅、內人嬌、朝天紫、陳州紫、哀家紫、御衣紫、斬黃、玉抱肚。

勝瑯、白玉盤、碧玉盤、界金樓、樓子紅。

3. 「花鏡」所載有下列品種。


正黃色：御衣黃、甘草黃、愛雲黃、金帶腰、女貞黃。

大紅色：錦袍紅、狀元紅、朱砂紅、醉胭脂、西瓜紅、錦繡毯、剪絨。

桃紅色：蓮蕊紅、鳳頭紅、添色紅、大葉桃紅、皺葉紅、殿春芳、四面鏡、醉仙桃、花紅繡毯。

粉紅色：觀音面、粉西施、玉兔天香、醉楊妃、倒暈檀心、大紅球、紅玉盤、瑪瑙盤。
紫色：腰金紫、金花狀元、紫羅袍、茄花紫、瑞香紫、紫繡毯、紫玉。
白色：玉天仙、慶天香、綠邊白、密嬌姿、水晶球、玉剪裁、鳳尾白。
青色：佛頭青、綠胡蝶、鴨蛋青。

含苞待放的大玉(孫志浩)



上盆的牡丹，先置於普通室溫內，然後於十一月中旬，徐徐加溫，並多澆水。夜間溫度達二五度C以上，如此經四、五日，花芽開始膨脹發育。一個月後，可以看到有顏色的花瓣呈現出來。花蕾如發育不良，表示低溫處理不足。如只有花蕾發育，葉片不生長時，即爲低溫處理過分。

一般露地栽植，應考慮到將來之發育，以定植後不移植爲原則。株間要寬廣，一般以〇·九—一·二公尺爲宜。植穴深度及穴徑約三〇公分。將堆肥七·五公斤，腐熟雞糞〇·二公斤放進穴中，並充分攪拌。爲避免根部直接接觸肥料，可加普通土五公分。栽植時，將接木接口處，埋入三公分左右。二月下旬及五月下旬各施追肥一次，每株施用安全肥料〇·一—〇·二公斤，並加豆餅水。

整枝剪定

九、十月間枝條剪定，將枯枝、折斷枝、病虫害枝、徒長枝、冗枝剪除，葉片自葉柄處剪除。

牡丹花芽於七月下旬形成，至九月間，從外觀上可以辨別，較葉芽肥大。一枝條上花芽只留頂端二芽即可，基部花芽，應予摘除。開花過多，樹勢易於衰弱。

春季自根部發生不定芽，大都爲砧木芽(芍藥或牡丹)，應及早除去。

牡丹不畏霜寒，不必防寒設備。

在開花前，應立支柱，以防因花重倒伏。花後，自花基下切除，以防結實。花後保留葉片，助長發育。

病虫防治

牡丹莖葉的白澀病、銹病、輪紋病等，可用「波爾多液」、「大生」防除。根部發生白絹病或腐爛病時，應行土壤消毒。介壳虫用「夏油乳劑」防治。