

# 古書上的牡丹品種

益。

牡丹爲我國著名花卉，古書上記載的名稱很多，現在摘錄洛陽牡丹記、天彭牡丹譜及花鏡三種，即已美不勝收，園藝專家如將古今品種一一對照鑑定，諒可獲得許多寶貴資料。

1. 宋代歐陽修「洛陽牡丹記」中所錄，有下列品種。

姚黃、魏花、韋紅、細葉壽安、牛家黃、潛溪緋、左花、獻來紅、葉底紫。

鶴翎紅、添色紅、倒暈檀心、朱砂紅、九蕊真珠、延州紅、多葉紫。

粗葉壽安、丹州紅、蓮花萼、一百五、鹿昭花、甘草黃、一厭紅、玉板白。

2. 陸游「天彭牡丹譜」所載品種亦多。

紅花：獻元紅、祥雲、紹興春、燕脂樓、玉腰樓、金腰樓、富貴紅、一尺紅。

雙頭紅、鹿胎紅、文公紅、政和春、醉西施、迎日紅、彩霞、疊羅、勝疊羅、瑞露蟬、乾花、大千葉、小千葉。

紫花：紫繡毯、乾道紫、潑墨紫、葛中紫、福嚴紫。

黃花：禁苑黃、慶雲黃、青心黃、黃氣毯。

白花：玉樓子、劉師哥、玉覆盆。

鴉花：歐碧。  
其他：轉枝紅、朝霞紅、洒金紅、瑞雲紅。

壽陽紅、深春毯、冰囊紅、福勝紅、油紅、青絲紅、紅鵝毛。

粉鵝毛、登金毯、間綠樓、銀絲樓、六對蟬、洛陽春、海芙蓉。

賦玉紅、內人嬌、朝天紫、陳州紫、哀家紫、御衣紫、斬黃、玉抱肚。

勝瑯、白玉盤、碧玉盤、界金樓、樓子紅。

3. 「花鏡」所載有下列品種。


正黃色：御衣黃、甘草黃、愛雲黃、金帶腰、女貞黃。

大紅色：錦袍紅、狀元紅、朱砂紅、醉胭脂、西瓜穠錦繡毯、剪絨。

桃紅色：蓮蕊紅、鳳頭紅、添色紅、大葉桃紅、皺葉紅、殿春芳、四面鏡、醉仙桃、花紅繡毯。

粉紅色：觀音面、粉西施、玉兔天香、醉楊妃、倒暈檀心、大紅球、紅玉盤、瑪瑙盤。  
紫色：腰金紫、金花狀元、紫羅袍、茄花紫、瑞香紫、紫繡毯、紫玉。  
白色：玉天仙、慶天香、綠邊白、密嬌姿、水晶球、玉剪裁、鳳尾白。  
青色：佛頭青、綠胡蝶、鴨蛋青。

含苞待放的大玉(孫志浩)



上盆的牡丹，先置於普通室溫內，然後於十一月中旬，徐徐加溫，並多澆水。夜間溫度達二五度C以上，如此經四、五日，花芽開始膨脹發育。一個月後，可以看到有顏色的花瓣呈現出來。花蕾如發育不良，表示低溫處理不足。如只有花蕾發育，葉片不生長時，即爲低溫處理過分。

一般露地栽植，應考慮到將來之發育，以定植後不移植爲原則。株間要寬廣，一般以〇·九—一·二公尺爲宜。植穴深度及穴徑約三〇公分。將堆肥七·五公斤，腐熟雞糞〇·二公斤放進穴中，並充分攪拌。爲避免根部直接接觸肥料，可加普通土五公分。栽植時，將接木接口處，埋入三公分左右。二月下旬及五月下旬各施追肥一次，每株施用安全肥料〇·一—〇·二公斤，並加豆餅水。

## 整枝剪定

九、十月間枝條剪定，將枯枝、折斷枝、病虫害枝、徒長枝、冗枝剪除，葉片自葉柄處剪除。

牡丹花芽於七月下旬形成，至九月間，從外觀上可以辨別，較葉芽肥大。一枝條上花芽只留頂端二芽即可，基部花芽，應予摘除。開花過多，樹勢易於衰弱。

春季自根部發生不定芽，大都爲砧木芽(芍藥或牡丹)，應及早除去。

牡丹不畏霜寒，不必防寒設備。在開花前，應立支柱，以防因花重倒伏。花後，自花基下切除，以防結實。花後保留葉片，助長發育。

## 病虫防治

牡丹莖葉的白蠟病、銹病、輪紋病等，可用「波爾多液」、「大生」防除。根部發生白絹病或腐爛病時，應行土壤消毒。介壳虫用「夏油乳劑」防治。