



南美紫茉莉

盆景四種

林樹之

本植物盆栽，要根據植物特質及生長習性來決定花盆的大小。依照不同的用途與布置地點，花盆的形狀也要適當選擇。大庭園或寬敞場所，應配以大盆，否則用小盆。盆內土壤要適時調換整理，種在盆內的植物才能生長旺盛，表現優點。

南美紫茉莉

南美紫茉莉即是九重葛(參看本刊二三卷一期)，紫茉莉科學名：*Bougainvillea brasiliensis*，花有赭、紫、黃色，培育盆內，雖年久亦可開花，有返老還童之象。

利用嫁接法，嫁接斑葉種，白綠相間，使人神往。

扦插要點如下：

插穗：插穗宜採上年生長組織充實的枝條中段，直徑一至二公分者為上選。葉柄基部上方，生有向下彎曲長刺，與其他樹木生長在葉基部下方者不同。

注意：扦插時容易顛倒，如顛倒就不能成活。

預排：插穗用修剪鋏剪成長一五、二〇公分，避免損傷表皮。上端用利刃削平，下端為耳形，把葉剪光。

可將插穗浸於一：一〇石灰水溶液內(即石灰為一，水為一〇分)再加〇·一%過錳酸鉀液浸一晝夜，可促進發根。

扦插：三、四月扦插，用沙質壤土，苗床寬一公尺。南部此時恰為乾季，扦插前先用兩灘水澆灌，到第二、三天，看土壤濕潤情形扦插。

如作綠籬，先在預掘水溝內灌水，再行扦插，成活率高。插穗留一、二芽於土面上，覆土後用腳鎮壓，覆蓋稻草。

管理：插後土壤宜保持濕潤，南部注意蝸牛，可撒佈鳥肥(氮、磷、鉀)防治。二、三年生苗即可移植盆中。

肯氏南洋杉

肯氏南洋杉是常綠樹，學名：*Arucaria Cunninghamii*。栽培在花盆內，常年青綠，使人精神煥發，胸襟開闊，產生發奮圖強的心情。

肯氏南洋杉的繁殖法，可用播種或扦插法。台灣母樹少，種子缺乏，播種法不易實行，扦插法較為實用。

插條採取七、八或一二、一三年生主枝。插穗長度二〇、七〇公分。

最新天然殺蟲劑 (北市農藥字第1085號)

大寶

DIPEL®

(HD-1型蘇力菌)

使用倍數：1,500~3,000倍

Abbott Laboratories
美國雅培大藥廠出品

台灣總代理：

華欣貿易有限公司
台北市南京西路五十號
TEL: 570708 · 570953

- 效力宏大持久
- 人畜植無毒害
- 極安定不變質
- 品質保證劃一
- 用量少最經濟

台灣總經銷：

惠光貿易有限公司
台南市東門路231號
TEL: 24971

牡丹王花

牡丹向有花王之稱，為我國古代詩文中詠贊的對象。今年春節期節，台中台北都先後舉辦過牡丹展覽會，引起大家對牡丹的興趣。

可是，牡丹是溫帶花卉，在台灣究竟能否栽培呢？林進益於本期四十二頁「在台灣種牡丹花」文中，就栽培牡丹的品種與技術問題，已有相當詳細的討論。

林進益先生在日本千葉大學研究園藝，春節返台度假，應本刊特約，為我們趕寫出這一篇專稿，是非常可貴的資料。

同時，我們還約請了中興大學的葆良教授，着重我國歷史上對牡丹重視的情形，撰成「牡丹史話」一篇特寫，預定下期發表。

扦插時期宜在樹液開始流動，新芽未開之前，約為一二月間。

插穗採取後，當日即需插完。苗床整理妥善，用插條鏤開孔。扦插深度以全長的三分之一為原則，插後可用稻草覆蓋。

成活二至三年後即可移植花盆內。

梭竹

梭竹的學名是：Rhapis excelsa，是梭欄科的常綠灌木，栽作盆景可為大庭園、工廠、或機關、商店等布置環境之用。

一般繁殖採用分株法：全株葉用利刃刈去，選帶有鞭根者，移入花盆內。

梭竹萌芽力強，選直徑（

內徑）三〇公分，高二五公分的大形花盆。

經常注意花盆換土，抑制過盛生長。


黃椰子

黃椰子也是梭欄科植物，學名：Chrysalidocarpus lutescens，盆栽用途與梭竹相同。盆栽時，也可以採用分株法。

叢生黃椰子，選小株，四、五株一叢，在土壤濕潤時，先用鋤頭把四周挖開。然後再用鐵鏟掘起，移植在內徑三〇公分，高二五公分的大形花盆內。

黃椰子萌芽力強，做盆景栽培，也要注意換土，抑制過盛生長。

• • •



黃椰子

肯氏南洋杉

梭竹