

農友經驗



初生仔豬如何管理？

仔豬對於自然環境的變化及外界細菌、病毒的抵抗力均弱，因此，易發生疾病與死亡，影响到經營者的利潤。

現將仔豬的飼養管理法介紹如下：

仔豬初生後，在管理上應注意下列幾點：

(1) 破開胎膜：當仔豬由母體分娩出後，需隨時用乾布拭乾，尤需注意鼻、口的黏液，以防胎兒窒息而死。

(2) 剪斷臍帶：將臍帶結紮消毒後剪斷，然後取出放入木箱中。待全部分娩完畢後，先放入一、二頭讓其吸乳，見母豬安靜哺乳時，才全窩放入吮乳。初生後一周內所吸的乳汁為初乳，初乳含有豐富的維他命及抗體，並帶有輕瀉性，對仔豬以後的健康影响很大。

同時在初生後二、三天中，仔豬所吸吮乳頭尚未確定，俗稱的分乳，此時需選擇體弱的仔豬吸吮二、三對的乳頭。因靠胸部的乳頭泌乳量較豐，如此才可使全胎仔豬發育整齊。

(3) 嚴防壓死：要防止被母豬壓死，必需在母豬舍內設防壓欄。現在更有人用母豬分碗欄，效果更好。

(4) 保溫設備：豬對氣候的變

化很敏感，適溫為十六、十八度C。但仔豬却缺乏抗寒力，初生後必需利用保溫燈保溫，溫度約在二六、二八度C左右，視仔豬羣居程度而調整，如仔豬密集燈下，是溫度太低，仔豬遠離溫源，而有呼吸困難狀，即溫度過高，均勻分散溫源下為適中。

(5) 仔豬的去勢：普通於一個月齡時去勢，去勢絕不能與離乳、防疫同時舉行。

(6) 預防注射：初生後三十、四十天，在豬健康時接受防疫注射。


仔豬在飼養方面應注意事項：
(1) 仔豬的寄養：母豬分娩仔豬過多超出乳頭數時，可寄養於別的母豬，或分批輪班飼養，並加些人工乳補充營養。

(2) 仔豬教槽：仔豬初生後七、十日便需教槽，教槽料以高蛋白較細的精料，採用任食方式，以早期離乳，達到年產二、三胎標準。

(3) 離乳期：仔豬在初生後一個月左右即需離乳，要慢慢進行。但一般農家均立刻將母仔分離，會影響到母仔豬的健康及生理上的不慣。

(4) 教槽飼料：飼料必須含蛋白質在二二%左右，採用任食方式，必需注意飼料的新鮮度，避免供給發霉飼料。(南

投鏡彰南路三一、二之一號洪金山。)



減少病害，增加產量30%

請用美國夏威夷、琉球、東南亞鳳梨農場一致採用，最神效鳳梨生長荷爾蒙。

ANATON 98

アナトン


鳳梨多旺

可溶性粉劑
98%

總代理 大三晃貿易有限公司
台中市大公街17巷4號
TEL. 36208 · 35691

經銷商 禾豐農藥行 彰化市大竹里22號之1 TEL. 25776
慶雲農藥行 鳳山鎮第1市場內73號 TEL. 462605

台灣省農林藥登記證第2344號



經濟部正式推廣使用
鳳梨果實生長荷爾蒙