

適合沿海地區栽培的雜糧作物：

高粱·玉米

黃和炎

沿海地區的土壤，一般說來比較貧瘠，不適合種水稻。目前沿海地區推廣的作物以玉米、高粱、向日葵等雜糧作物為主。現分別介紹如下：

高粱

高粱性抗塩耐旱，最適合於沿海沙地種植。

民國六十一年起，省公賣局統一價格收購後，更引起沿海地區農民種植的興趣，不過仍須待有關當局酌增沿海地帶的分配額後，才可大量推廣種植。

(1) 品種：雜交高粱台中三號、台中一號(兼防風作用)。

(2) 栽培時期：春作三月中旬至四月上旬，秋作為六月下旬至七月中旬。

春作栽培，於收穫後立刻宿根處理，亦可得到同樣的產量。

(3) 施肥管理：此照玉米的施肥法。

(4) 其他請參照農林廳編印的農民淺說一〇一H—特作〇一二號。

玉米

(1) 品種：有雜交玉米台南五號、十一號等。

(2) 栽培時期：沿海地帶由於十月至三月間季節風強烈，海邊種植並非理想地。但目前省產飼料玉米供不應求，尤其農牧綜合經營區，以玉

米養豬，更迫切需要種植玉米。

依據試驗得知，沿海較適合的播種期是春作為二月(需有防風設備)，秋作為八月(排水良好)，但以春作為較安定。

最經濟防風辦法是十月中旬至十一月上旬，依造下一年春作物的行距條播油菜或大麥，翌年於行間種植玉米，待季節風過後收穫油菜大麥。


(3) 施肥管理：每公頃施用硫酸銨六〇〇〇至七五〇公斤、過磷酸鈣三五〇〇至五〇〇公斤、氯化鉀五〇〇至九〇〇公斤。

氮肥分基肥、第一次追肥(發芽後二〇至二五日後)、第二次追肥(四五至五〇日後)各施用三分之一，磷肥全部當基肥施用，鉀肥分基肥及第一次追肥各施一半。

(4) 病虫害防治：秋作玉米虫害較少，於播種後三〇至五〇天噴「依必安」八〇〇至一、〇〇〇倍，七〇天噴五〇%「賽文」可濕性粉劑五〇〇倍。

春作玉米螟虫嚴重，須注意防治，於播種後十五天噴依必安一、〇〇〇倍。

至雄花抽穗前每隔十天施「賽文」一粒劑於每株的生長點上，每株二三公克，以後噴一二次五〇%賽文可濕性粉劑五〇〇倍。



硫酸鉀

K₂O 50%以上

適用作物：

菸葉、鳳梨、葡萄、柑桔、梨、桃、檸檬、荔枝、馬鈴薯、番石榴、蕃茄、蘆筍及其他一般果樹。

使用效果

- 一、菸葉：所含氯成分(Chloride)在0.90%以下可降低尼古丁含量，增加葉內糖分及菸葉香味，並有助病蟲害之抵抗力。
- 二、鳳梨：質量、密度及糖分提高，葉片擴大，光合作用率高，使產量增加。
- 三、葡萄：果糖增加，果皮乳白鮮艷，藤枝堅實，不易枯死。
- 四、柑桔：果實肥大，果皮變薄，色澤濃而美麗，果汁濃度增加，風味佳良，酸份減少，更耐貯藏，樹體組織強健，增加耐寒，並可抵抗病蟲害。
- 五、番石榴：果肉不易軟化，而較香脆，且增加糖分，能長期貯藏。果皮不變黑，葉片小而強韌，枝莖硬實，不為強光所灼傷，被風吹折。
- 六、馬鈴薯：果實肥大，果肉水分減少，糖分及澱粉量增加，可長期貯藏。
- 七、蕃茄：糖分增加，色澤鮮艷，果實肥大均一，維生素丙(Vitamine C)提高。
- 八、其他果樹：糖分增加，果肉肥美，果皮色澤鮮艷。

東南碱業股份有限公司

總公司：台北市中山北路二段70號
工廠：台灣省宜蘭縣蘇澳鎮

電話：548680~4
電話：144