

農業信箱

〔問〕：(一)目前木瓜種類很多，那一種品質優、產量豐、抗病力強？(二)種植木瓜應擇何種土壤較好？(三)對排水及灌水應作何種設備？

(三) 在生長期間，對施肥及管理技術方面應注意那些？

(四)栽植木瓜在什麼時期比較適合栽植後需多久可以採收？(彰化縣大村鄉大村國小游進京)

〔答〕：(一)目前適於本省經濟栽培，且最受市場歡迎的生食用木瓜品種爲「蘇魯一號」。它的品質優，含水量低，耐儲運，果型大小整齊，不過平均果重僅約一台斤，產量也屬中等。

「台農雜交三號」產量高、果大，但品質較差，目前鳳山熱帶園藝試驗分所已無該種子供售，須待今年九月間始有新採種子供售。

(二)栽培木瓜宜選鬆軟肥沃、土層深厚、富有機質、通氣排水良好的沙質壤土，土壤反應宜在PH（酸鹼度）六·五之間。

定植宜做高畦（坡地不必），以利排水，乾旱期宜每周灌溉一次。

(三)木瓜在本省中南部地區，終年均可栽培，然以九月十一月或二、三月栽植最爲適宜。定植後約十個月可

採收，依品種、定植期及栽培管理之不同而稍有差異。

(四)去年五、七月間連
續大雨，高屏地區大部分
木瓜皆因「根腐」而死。
即使沒浸死，果實也因患

「疫病」而遭遺棄，市場木瓜供應幾陷中斷，產地售價由每台斤一・二元升至五元以上，創下有史以來最高售價。

• 目前售價雖又回復到每台斤約一五元左右，但仍供不應求。（王德男）

〔問〕：(一)每逢冬季蜂勢大減，空蜂脾是否須提出保存？隔板空間部分塞草，有此必要嗎？

(二) 提出儲存空牌，如何長期保存不受蠟虫爲害？

③受蜡虫爲害的蜂脾，以二氯苯處理時，需注意什麼才能維護人畜安全？二氯苯毒性如何？人畜中毒症狀怎樣？（霧峯鄉桐林村民生路三四二號陳風陣）

〔答〕：(一)本省冬季較爲暖和，蜜蜂過冬並無多大危險。但若蜂勢大減，蜂羣變弱，則應將空脾抽出，以防蜡蛾發生。空隙處應以稻草填塞，以保箱內溫度。

(二) 提出儲存的空脾，最好都用二硫化碳熏蒸，然後保藏在清潔的乾燥室備用，室內的溫度要保持在—五度C以下。

二硫化碳的熏蒸法：先將空巢脾放入空箱內，每箱置十枚。再於框上置一小盤，將二硫化碳放在盤內，然

後將蓋子蓋緊，以紙糊好縫隙。由於二硫化砷爲空氣重的二倍半，所以氣味會下降，如此可將蠟蛾全部殺死，二硫化砷使用量爲每五〇〇枚用四五〇公克。

二硫化碳有毒，所以熏蒸應在室外進行，以免中毒。封緊熏蒸處理後，次日打開蓋子，使氣體發散，而後乾燥保存。（高學文）

③二氯苯 (Paradichlorobenzene) 簡稱PDB，為白色結晶體，能緩慢的變成氣體，氣味難聞，較空氣為重。若按照指示的濃度施用，對人體無害。

但積年累月的呼吸此蒸氣，能導致頭疼、惡心、嘔吐、衰弱、門靜脈性硬變、肝臟亞急性性黃色萎縮、內障、貧血、顆粒血球貧乏之症，對皮膚、眼睛、喉嚨也有刺激性。

此氣體不是可燃性，也不具爆炸性，但能殺死蛾蠟的成虫，不過對卵無害。若以PDB熏蒸時，纖維必須緊緊，縫隙則必須以紙條用膠水黏好。以二、三茶匙的結晶體，直接撒在巢脾的框上，或框上置一紙片，將結晶置於其上也可以。

因此氣體無毒，且無不舒服之感，可在普通的倉庫內處理，無需將受害物搬出室外。

在儲藏季節一定期間內，將堆置物的蓋子打開檢查，若此結晶已升華完了，則須加添。

PDB 在溫度高於華氏七〇度時，更具效果。溫度上升時，揮發得更快。

一般而言，大約二、三星期須檢查儲藏物一次，通常視倉庫的溫度和成蛾的爲害情形而定。（高穗生）

銷外產農展發 產生業農進促

- 一、收受活期，定期儲蓄存款。
- 二、農業生產放款。
- 三、特種農作物生產放款。
- 四、農產品加工運銷放款。
- 五、農業機械化放款。
- 六、養豬，肉牛及乳牛專案放款。
- 七、運銷包裝現代化放款。
- 八、農會週轉金放款。
- 九、養殖，漁業及漁船建造放款。
- 十、辦理國內外匯兌。
- 十一、辦理進出口押匯。
- 十二、辦理保稅及保証業務。

號	三	十	五	街	寧	懷	市	北	台	處	理	管	總
號	三	十	八	路	權	民	市	中	台	行	分	中	台
號	〇	三	二	路	四	正	中	市	雄	行	分	雄	高
號	五	十	三	路	正	中	市	南	台	處	事	辦	南
號	一	〇	二	路	山	中	市	義	嘉	處	事	辦	義