

向日葵

黃和炎

始期)及六〇~六五天(開花盛期)各於一次的濕潤灌漑。

向日葵為新興的食用油料作物，一般油用者植株矮小，適合沿海沙地栽培。

最近人類對於植物油的消費逐漸增加，而且目前鄉村勞力缺乏，花生採收費工，但向日葵收成容易、省工，將來或可取代花生。

目前企業生產保證價格每公斤為九元，每公頃產量一、五〇~二、〇〇公斤。

台南區農業改良場計畫於六十二年春作起全面推廣。

(1) 品種：矮性油用向日葵。

(2) 時期：向日葵全年均可栽培，但沿海氣候特殊，以二月播種較適合(需有防風設備)，於雨季來臨前採收，生育日數八〇~一〇〇天。

(3) 栽植密度：每公頃種植六〇〇~六、五〇〇株為宜，行株距六〇×二〇公分最適合，開溝播種，每穴三十五粒。

(4) 開苗：於發芽後二~三星期進行，每穴留一株。



栽培向日葵，可給來往的人欣賞美麗的花朵，供給蜜蜂蜜源，增加收益。

(5) 施肥管理：每公頃用硫酸鉀三〇〇~五〇〇公斤、過磷酸鈣三〇〇~五〇〇公斤、氯化鉀四〇~八〇公斤、氮肥及鉀肥的半量當基肥，剩下半量於發芽後三〇~四〇天用作追肥，磷肥全部作為基肥施用。施肥時同時進行培土工作。

(6) 灌溉：通常於發芽後三~四五天(花蕾形成初期)、四五天(開花


拉松一、〇〇〇倍、賽文五〇〇~八〇〇倍防治蟲害。以二五%的可利生可濕性粉劑一、〇〇〇倍防治病害。視實際情形防治二~三次。

(8) 收穫及調製：大約開花後三〇~四五天為成熟期，即頭狀花序背面黃花，用鋒刀割取花軸部分，經二~三天太陽晒後，用棒敲打或脫粒機脫粒。

然後將種子晒乾至含水量一二%以下，用風選機精選後，裝袋存於陰乾處或送油廠榨油。

圓方牌農藥

信譽的標誌



針對稻熱病兩大冠星！

稻強液劑 2% (カスミン)

喜樂生 乳劑 48% (キタジン)

最新進口——現貨供應——

益米靈

Imidan 50% W.P.

福蘭培

Folpet 50% W.P.

蓋撲丹

Captan 50% W.P.

白粉克

Dinocap 48% E.C.

允發農化工廠有限公司 台北市東園街101巷99弄11號 TEL. 336549~370288