

適合沿海地區栽培的

向日葵

黃和炎

向日葵為新興的食用油料作物，一般油用者植株矮小，適合沿海沙地栽培。

最近人類對於植物油消費逐漸增加，而且目前鄉村勞力缺乏，花生採收費工，但向日葵收成容易、省工，將來或可取代花生。

目前企業生產保證價格每公升為九元，每公頃產量一、五〇〇~二、〇〇〇公升。

台南區農業改良場計畫於六十二年春作起全面推廣。

(1) 品種：矮性油用向日葵。 (2) 時期：向日葵全年均可栽培，但沿海氣候特殊，以二月播種較適合(需有防風設備)，於雨季來臨前採收，生育日數八〇~一〇〇天。

(3) 栽植密度：每公頃種植六、〇〇〇~六、五〇〇株為宜，行株距六〇×二〇公分最合適，開溝播種，每穴三~五粒。

(4) 間苗：於發芽後二~三星期進行，每穴留一株。

(5) 施肥管理：每公頃用硫酸銨三〇〇~五〇〇公斤、過磷酸鈣三〇〇~五〇〇公斤、氯化鉀四〇~八〇公斤、氮肥及鉀肥的半量常基肥，剩下半量於發芽後三〇~四〇天用作追肥，磷肥全部作為基肥施用。施追肥時同時進行培土工作。

(6) 灌溉：通常於發芽後三〇天(花蕾形成初期)、四五天(開花

栽培向日葵，可給來往的人欣賞美麗的花朵，供給蜜蜂蜜源，增加收益。右圖是余洪靜琴農友站在地栽培的向日葵田裡。(余清雲)



然後將種子晒乾至含水量一二%以下，用風選機精選後，裝袋存於陰乾處或送油廠榨油。

粒機脫粒。

防治：生育期以巴拉松一、〇〇〇倍、賽文五〇〇~八〇〇倍防治虫害。以二五%的可利生可濕性粉劑一、〇〇〇倍防治病害。視實際情形防治二~三次。

(7) 病虫害
始期)及六〇~六五天(開花盛期)各給於一次的澆灌。

信譽的標誌



農藥牌方圓

針對稻熱病兩大剋星！

稻強 液劑 2% (カスミン)

喜樂生 乳劑 48% (キタジン)

——最新進口—— 現貨供應 ——

益米靈

Imidan 50% W.P.

福爾培

Folpet 50% W.P.

蓋撲丹

Captan 50% W.P.

白粉克

Dinocap 48% E.C.

允發農化工廠有限公司 台北市東園街101巷99弄11號 TEL. 336549 · 370288