

瓠瓜又叫扁蒲，是屬葫蘆科植物，因生長強健，莖勢旺盛，我國自古各地均有栽培。

一般果為綠白色，大而平滑，有長筒、扁圓、細腰等形。大型果當果肉未硬化前，切成帶狀，烘乾為乾菜，可供外銷。

味有甘、苦二種，甘味種在嫩軟未熟時供煮食、炒食、肉質細嫩，鮮美可口。苦味種可供嫁接瓜類砧木。過熟之果硬化不能食用，僅可剖製瓢或樽。觀賞用種，在果實老化前後，經過美化，是室內高級裝飾物。

瓠瓜對於土質不甚選擇，瘠薄之地亦能生育，在太肥之地促使莖葉徒長繁茂，反而影響結果。選擇排水良好的沙質壤土及腐植土最為適宜，PH值為六·七·五。瓠瓜喜溫暖，陽光照射充分之處，可抑制植株徒長，促使雌花着生良好，不易落花落果。

瓠瓜在本省南部自十二月開始播種。播種方法有直播和床播二種。播種前，種子須用烏斯普龍一千倍液消毒，或用賜保根拌種消毒後播種，可預防前期炭疽病的發生。

直播者每穴三、四粒種子，亦有催芽播種者。如種子外殼太硬，可用夾子夾開種子尖端，以利發芽。栽植距離依品種而異，製造瓠乾用的為大果扁圓形種，行株距需要六×三公尺，以鮮蔬或觀賞為目的栽培的，以二×一·三公尺為宜。

瓠瓜幼苗時期，為預防黃守瓜及瓜實蠅為害，晝間宜以寒冷紗網罩罩。等到母蔓木葉展開六、七葉時，將先端摘心，以促進腋芽的發生與伸長，由發生出來的數個腋芽中，選留苗發育強壯的四芽為主蔓，其他的全部摘去，四主蔓應向四方誘引，使平均發育伸長，普通雌花着生在第七、九節。

瓠瓜因攀緣力強，為促進生育，提高品質，宜採高架栽培，於母蔓長二公尺左右時架棚誘引上棚，並將子蔓排引四方，俾於將來發育茂盛時，不致過於叢集而利透光，着果才良好。

瓠瓜

瓠瓜，又名匏瓜，或稱扁蒲，台語叫做ㄅㄨˊ仔！

瓠瓜為雌雄異花，雄花先開為數甚多，宜作適度修剪，則利嫩果發育，其着果的良否與虫類（蜜蜂）媒介有關。因此，在天寒氣冷時宜行人工授粉。人工授粉在清晨六、八時最好，工作時應小心不可擦傷幼果的毛茸。

開花結果後，依品種而異，一般每蔓留優良果實二、三果，其他果實及早摘除，以免影響植株生長。

瓠瓜不需過多的肥料，因莖葉發育過旺時，反影響結果。氮素成分不宜多施，須適宜加用磷酸及鉀肥，以抑制生長繁茂。基肥每十公畝堆肥六〇〇公斤，過磷酸鈣二五公斤，草木灰十五公斤，追肥分二次施用，每次尿素六公斤，氯化鉀六公斤。

瓠瓜品種因用途不同，可分鮮蔬，加工及觀賞用三類：

- ①牛腿瓠：瓜果碩大，橢圓形，形狀似牛腿故稱牛腿瓠。加工切成帶狀，烘乾為菜乾，供外銷或儲藏用。鮮蔬果形太大，較不受消費者歡迎。
- ②虎斑大圓瓠：中早生種，植株生長健旺，抗白粉病，果大，圓球形，外皮似虎斑紋狀，嫩果果肉白色，緻密品質好，耐儲藏，產量高，供蔬食為主。
- ③白皮早生瓠：早生種，果形長圓，外皮綠白色，成熟後變黃白色，因肉質鮮美，果形中等，是本省鮮蔬主要的品種。
- ④葫蘆瓠：為觀賞用品種，在果實老化前，經過雕刻，成熟後再加美

瓠瓜可作高級的裝飾物。本品種莖性攀緣力強，宜採高架栽培，以利透光，着果好，產量才能精良。匍作瓜果易腐爛，果實透光着色不好。嫩果可供煮食、炒食、肉質鮮美是極好的佐食菜餚。

瓠瓜主要病虫害有：

- ①白粉病：多濕多肥時易發生，葉面上呈現白粉末，繼之變黃而枯萎，發病初期噴射可利生一〇〇倍液，每隔七天噴射一次連續三次。
- ②露菌病：初期葉面呈黃色小斑點，後擴大變淡褐色，病斑為多角形，裡面有黑灰色微狀物，病葉不久即枯萎。可噴射好速殺四〇〇倍液，自木葉展開三、四枚開始，每七、十日噴射一次，連續四次。
- ③瓜實蠅：用二五馬拉松可濕性粉劑加水四〇〇倍，於開花結果時，每七日噴射一次，可防瓜實蠅發生。
- ④黃守瓜：成虫食害葉部，有網狀食痕，幼苗被害常致枯死，幼虫為害根部，噴射八五多賽文可濕性粉劑一、〇〇〇倍液可防治。其他病虫害可參考農林廳植物保護推廣方法防治。



瓠瓜