



### 乳牛飼養

〔問〕：(一)乳牛有那幾種？產乳量較多的是那一種？

(二)乳牛在何處可買到？

(三)已生產乳的乳牛，一頭需多少錢？

(四)飼料除青草外，還需配給何種飼料使產乳量增加？

(五)目前桃園、新竹有那幾家煉乳加工廠收購鮮乳？(台北樹林鎮保安街三段三八號轉彭元春)

〔答〕：(一)乳牛品種很多，但是其中比較有名，而且飼養比較普遍者有以下幾種：荷蘭乳牛、絕賽乳牛、耕賽乳牛、愛爾夏乳牛、乳用短角牛及瑞士乳牛等，以上六種乳牛，本省都曾經引進飼養。不過目前飼養最多者，還是荷蘭牛，據估計約占全省乳牛總頭數九〇%以上。

(二)本省目前飼養乳牛牧場，據初步調查約有一百多處。這些牧場大部分散布在北、中、南各大城市，他們中間可能有的願意出售，不過買牛之前，最好請教當地鄉鎮公所，協助介紹。

(三)一頭乳牛價格多少，這是很難說的，因為一頭牛的好壞，不但要根據牠的年齡、產乳量，同時還要知道牠祖先遺傳的情形。目前一頭初產母

牛，如果牠的乳量一天平均有十公斤以上(產後二個月，日產量有十五公斤)，大約在三萬五千至四萬元上下。

(四)飼養乳牛，除了每天必須供給大量青草外，還需補充精飼料。有關乳牛飼養方法，需要根據很多因素來決定，譬如牠的體重，每日產乳量，乳中脂肪含量等，不能一概而論。


乳量與精料比，要根據母牛一天產乳量多少，然後再計算給與精料量，通常比例是四比一或是三比一。

前者是指每四公斤牛乳，應加給精料一公斤，如果一頭乳牛一天產乳量一六公斤，就應加給精料四公斤；後者每產三公斤牛乳，給與精料一公斤，如果一頭乳牛日產一五公斤，精料給量應為五公斤。

究竟應採用那一種方式就要看你的銀牛的青草或青儲草料，以及乾草的品質和銀量了。

以上所提簡易餵飼乳牛的方法，是指一頭母牛一天生產牛乳在十公斤以上時的精料給與量。如果一頭乳牛一天生產牛乳不到六、七公斤時，而草量足，草的品質也不差，就不必照上述方法加添精料。

不過目前本省一般乳牛，平均日產牛乳約在十二公斤以上。



(五)目前桃園新竹地區還沒有一家煉乳加工廠，不過在以上地區已有牧場和酪農，他們生產的原料生乳，由台北兩三家牛乳加工廠收購。(林誠華)

### 洋菇腦菌病

〔問〕：(一)洋菇腦菌病如何發生？有何症狀？

(二)發現之後要如何處置？

(三)褐痘病使用萬力藥劑(杜邦公司出品)，對洋菇菌絲會導致死亡？

(四)洋菇死於覆土中，是否因溫度過高或受到萬力的藥害而死亡？因溫度高低死亡與藥害死亡有何差異？

(五)在吹南風的天氣下，要如何處理菇舍通氣，才不致於使洋菇死亡？

(二)林鎮北平里安路巷一號洪紹錄

〔答〕：(一)腦菌病是由於腦菌混入菇床所引起的雜菌症。平常腦菌病稱為夏季病，在氣溫較高時(二十五度以上)容易發生，若氣溫在十三度C以下時，雖然有腦菌混入菌床中，仍不會為害。腦菌如雞腦狀，是黃白

色，發生在覆土下及堆肥中，小者如米粒，大者如畸形的洋菇。

(二)一旦發現有腦菌混生時，規模為害，用食塩撒於床土上，每坪用半斤左右，然後立即噴水，可控制蔓延。若全舍都有腦菌，就使用每畝三四〇號，每坪三公克加水一、二公升，噴撒可收到部分效果。即使未能完全控制腦菌，但洋菇仍能與腦菌共生。

(三)褐痘病使用萬力，有防治效果，但洋菇減產約十一、三%。

(四)殺菌劑的藥害是使幼菇長不出，而不是使幼菇死亡。幼菇枯死於土中原因，大概是高溫引起的細菌、線虫、菌類為害而死亡的較多。

(五)南風來時，灌溉水每公升加一零敵三四〇一公克使用。若南風繼續不停地吹時，一星期後再噴一次，即可減輕死亡率。(杜柏)

### 優良夏季蔬菜新品種

雜交甘藍 種苗一號 種子  
雜交花椰菜早生四十五天 種子

開始現貨供應 歡迎購買

農林廳種苗繁殖場

地址：台中縣新社鄉大南村中和街一四五號

### 栽培適期：

什交甘藍，中北部三、八月，南部二、九月，什交花椰菜，中北部七月上旬、八月中旬，南部七月中旬、九月中旬。

### 包裝：

什交甘藍及什交花椰菜每包均三〇公克(一分地用量)。

### 售價：

什交甘藍每包五十四元，什交花椰菜每包六十元，郵寄費七元，請將匯款匯交郵局郵政劃撥中字第二一八〇四號本場帳戶。

## 共有地各人部分 可自由分別處理

苗栗竹南鎮黃佩琴先生問：

甲、乙、丙、丁四人，共有一塊土地，在地上有建築物。今乙把應有的部分賣給甲，甲是否應該先請求丙、丁自願放棄承購權？如果丙、丁不願意放棄承購權，甲要買的時候，要怎樣辦理所有權移轉登記？

警察電台法律顧問張龍文律師答覆：共有物的共有人，依照民法第八一九條第一項的規定，各共有人可以自由處分他應有的部分。因此，乙有權出售他應有的部分，法律上並無規定其他共有人有優先購買權。

甲、乙願意買賣，乙丙無權干涉，在買賣成交以後，甲可以和乙一同到地政事務所，去辦理所有權移轉登記。

軍眷補給  
不得重覆

台北市南港區李繼義先生問：

(一)我的父親是軍人，早已去世，家中現賴父親的終身俸為生。我的弟弟在士校畢業後，現在也服役於部隊，但部隊未發弟弟的眷補，這是什麼緣故？

(二)我在入營服役前，曾申請區畫為補充兵役，已獲核准，後來又撤銷，原因是說我的弟弟已領有眷

補。實際上我的弟弟並未領有眷補，像這種情形，是否可在營中再向政府申請區畫為補充兵役？

省政信箱答覆：(一)你尊親屬已領有退休俸待遇及眷補給與，自不能再申報眷補。

(二)你已入營服役，不能再申請區畫為補充兵役。

## 沒有婚姻關係 雙方不受拘束

北市木柵區許貴雲問：乙女從小給別人作養女，五一年由父母作主，以招贅方式和丙男成婚，生有一個孩子。

當時只是請了兩桌客人，沒有舉行任何結婚儀式，也沒有辦理戶口登記和轉移。現在養父母死亡，丙男離家出走，對乙女母女生活完全不顧，乙女為了生活，想和別人結婚是否可

以？如丙男回來找麻煩怎麼辦？

警察電台法律顧問胡顯謀律師答覆：乙女和丙男既然沒有舉行任何公開的結婚儀式，只請了兩桌客，在法律上不能算是合法的結婚，只能算是同居關係。

同居的雙方，可以隨時和別人結婚，不受對方的拘束，因為法律上對同居人沒有保障的規定。不過為了避免糾紛，乙女不妨先請求法院判決乙女和丙男的婚姻關係不存在，等法院判決確定後，乙女就可以放心再結婚了。

## 豬皮膚病治療

[問]：(一)我家的豬患了皮膚病，如何治療？

(二)據說使用BHC洗皮膚可以嗎？(雲林縣水林鄉海埔村八五號陳水柱)

[答]：(一)豬的皮膚病種類很多，發生原因也複雜，如疥癬症、豬癬(微菌類皮膚者)、濕疹、傳染性膿泡性皮炎、皮膚不全、角化症等，但一般來說疥癬性皮膚病較多。

患疥癬性皮膚病如發痒劇烈，以豬體摩擦牆壁，皮膚發紅、斷毛、裂開，流淋巴液，生結痂皮，影響豬的安眠及食欲，生長緩慢。

(二)疥癬症應以殺虫劑治療，使用下列藥劑前，須先洗滌豬體。

(1)以〇·五%牛豬安噴射，每周一次至癢症為止。輕者一二次，中度二三次，重者需四五次，每頭豬約需五〇〇一、〇〇〇CC就夠了。

(2)〇·二五%BHC乳劑，或五%石灰礦黃水，效果與前者相同。冬天也可用石油乳劑，或硫磺軟膏塗擦均可。

(3)噴藥時，對豬舍牆壁、地面及各種用具，也加以噴藥，才能根絕。

(4)母豬分娩前，應徹底治療，仔豬才能避免感染。(張聯欣)

## 番茄頂腐病

[問]：(一)市面上出售的化學肥料三要素有幾種？

(二)「番茄多旺」是番茄生長營養素？

何時施用最好？

(一)番茄的果頂腐爛怎樣防治？(二)在番茄生育過程中，何時防治最好？(南投鹿谷鄉廣興村興隆路八八號賴為鈞)

[答]：(一)市面上出售的化肥計有：

氮肥 尿素、硫酸銨、磷肥 過磷酸鈣、鉀肥 氯化鉀、硫酸鉀。

(二)番茄多旺為植物荷爾蒙劑，使用方法將該劑稀釋一〇〇一、二〇倍，處理花叢。

(三)在番茄生育適溫時(攝氏一八—二五度)無須處理，至溫度超過攝氏二五度以上，或溫度低於攝氏十五度以下，因花粉發育不良，才利用番茄多旺處理，藉以提高着果率。

(四)番茄果頂腐病是因缺乏鈣質所引起的生理病，因此可用果樂鈣稀釋液噴射葉面，以補充鈣分。

(五)果頂腐敗病在高溫乾燥時容易發生，因此應注意澆水，實行畦面覆蓋，以減少土壤水分蒸發。同時不可偏用氮肥，且氮肥宜分多次少量施用，以利根部吸收鈣分。

有效防治時期，應在定植後七天開始，果樂鈣在第一花叢開花時噴射為佳。(王進生)

讀者請注意：來信詢問農業問題信件，請註明訂戶號碼，附回信信封並貼回郵。不同類的問題，最好分寫幾張信紙。

豐年讀者服務部

