

無子西瓜生產專業區

今日農村七月八日播出

在中央加速農村建設計畫中，為安定本省外銷無子西瓜的生產事業，在無子西瓜生產地雲林、花蓮縣內選定雲林的麥寮、台西、東勢、二崙、褒忠、元長、嵙背、四湖等八個鄉鎮及花蓮的壽豐、光復、鳳林等三個鄉鎮為外銷無子西瓜生產專業區，面積九百公頃，做有計畫的指導生產，實施契約栽培。

的生產事業，在無子西瓜生產

再經過全省區域性試驗和示範栽培，選定鳳山一號，於五十年進入全面推廣生產階段。

近年來栽培面積超過一千五百公頃，且有急速增加的趨勢，不但大量外銷，成為外銷西瓜的主要品種，而且成為世界上唯一有無子西瓜企業化生產及大量外銷的國家。

但是目前本省所生產的無子西瓜，品質仍不穩定，三角形並不是無子西瓜本身有問題，而是生產者缺乏了解栽培技術上的特性所引起的。

在專業區內除了組織瓜農，加強教育及生產指導外，並補助設置集貨場十五處，以利集貨及改進分級包裝。補助抽水灌溉設備四十五處，每處一

五、〇〇〇元，並且每公頃貸

放生產資金一萬元。

外銷工作的補導，是採用產地最低保證價格每公斤一元二角，由蔬菜公會於生產期前二角，由蔬菜公會於生產期前與省農會簽訂供應契約，由省農會辦理統一供應。

契約農戶所生產的無子西

瓜，由鄉鎮農會通知，憑交貨

紀錄卡按期集運於指定的集貨場，使生產者與運銷商能獲公平的利益。

三倍體無子西瓜育種，於民國四十六年開始，在農復會支援下，由鳳山熱帶園藝試驗分所負責試驗研究，到四十八年，育成九個三倍體無子西瓜品種，定名鳳山一號（九號），

較高，二為種子發芽有困難，發芽率低，需要特殊的處理，三因為深根性，耐濕性較弱，

四苗期發育稍弱，生長稍慢，

育苗率低，初花期不宜留果，

採收期較晚。

氣候對無子西瓜的生育影

響很大，春作以十二月（三月

旬）九月為適，苗期必須預備

地區栽種，播種期以八月中下旬為適，秋作僅適合南部

灌膠布防雨，由於三倍體無子西瓜在苗期較為衰弱，不耐寒，需高溫。因此要用PE塑膠袋來育苗，同時在低溫期必須用塑膠布隧道來保溫。

三倍體無子西瓜，除不希望像普通西瓜有六粒着色坚硬的秕之外，並且未發育的白色秕也應求愈小愈好，磷肥能促進種子或秕的發育，降低秕子西瓜的品質，因此要減少磷肥用量，而且要早點施下磷肥，以促進早期根部的發育，使其管理，除了幾個特點應該注意外，大體上和普通西瓜的栽培方法相似，凡具有普通西瓜栽培經驗的人，對無子西瓜的栽培技術，不會感到困難。

三倍體無子西瓜在栽培方

面的缺點，一為種子生產成本

參考。

友，農林廳印有指導手冊可供

菜。

颱風季節如何減輕作物災害？

今日農村七月十五日播出

暴雨過後，農作物多少都會遭受損害。

爲了協助農民在颱風季節減少農作物的損害，農林廳每年都透過雜誌、廣播電視系統以及巡迴教育方法，教導農民如何作好農作物的防颱準備工作，而且編印「減輕農作物颱風損害」的淺說，單張分發農民參考，希望大家互助合作，做好颱風前應有的準備。

颱風來的時候，常常有豪雨，帶來大量雨水，爲害農作物，所以田園中應事先修護灌排水溝。

水稻及雜糧，爲防止倒伏，宜多施磷鉀肥，以增加植株的抵抗力。可以收穫的農作物，應該在灌膠布隧道裏保溫。

西瓜在苗期較為衰弱，不耐寒，需高溫。因此要用PE塑膠袋來育苗，同時在低溫期必須用塑膠布隧道來保溫。

三倍體無子西瓜，除不希望像普通西瓜有六粒着色坚硬的秕之外，並且未發育的白色

秕也應求愈小愈好，磷肥能促進種子或秕的發育，降低秕子西瓜的品質，因此要減少磷肥用量，而且要早點施下磷肥，以促進早期根部的發育，使其管理，除了幾個特點應該注意外，大體上和普通西瓜的栽培方法相似，凡具有普通西瓜栽培經驗的人，對無子西瓜的栽培技術，不會感到困難。

三倍體無子西瓜在栽培方

面的缺點，一為種子生產成本

參考。

友，農林廳印有指導手冊可供

菜。

颱風季節如何減輕作物災害？

今日農村七月十五日播出

暴雨過後，農作物多少都會遭受損害。

爲了協助農民在颱風季節減少農作物的損害，農林廳每年都透過雜誌、廣播電視系統以及巡迴教育方法，教導農民如何作好農作物的防颱準備工作，而且編印「減輕農作物颱風損害」的淺說，單張分發農民參考，希望大家互助合作，做好颱風前應有的準備。

颱風來的時候，常常有豪雨，帶來大量雨水，爲害農作物，所以田園中應事先修護灌排水溝。

水稻及雜糧，爲防止倒伏，宜多施磷鉀肥，以增加植株的抵抗力。可以收穫的農作物，應該在灌膠布隧道裏保溫。

西瓜在苗期較為衰弱，不耐寒，需高溫。因此要用PE塑膠袋來育苗，同時在低溫期必須用塑膠布隧道來保溫。

三倍體無子西瓜，除不希望像普通西瓜有六粒着色坚硬的秕之外，並且未發育的白色

秕也應求愈小愈好，磷肥能促進種子或秕的發育，降低秕子西瓜的品質，因此要減少磷肥用量，而且要早點施下磷肥，以促進早期根部的發育，使其

抗風的能力，同時避免攝取吸芽，以免弄鬆土地

聽到了颱風預報時提早收穫。原料甘蔗則要提前培土及整理大小排水溝，提前剝掉枯乾的甘蔗葉，

蔗莖高的蔗園，應該搭竹架支柱，以防倒伏。

香蕉必須插立支柱，平時多施鉀肥，以增強

。水稻及雜糧，爲防止倒伏，宜多施磷鉀肥，以增加植株的抵抗力。可以收穫的農作物，應該在灌膠布隧道裏保溫。

西瓜在苗期較為衰弱，不耐寒，需高溫。因此要用PE塑膠袋來育苗，同時在低溫期必須用塑膠布隧道來保溫。

三倍體無子西瓜，除不希望像普通西瓜有六粒着色坚硬的秕之外，並且未發育的白色

秕也應求愈小愈好，磷肥能促進種子或秕的發育，降低秕子西瓜的品質，因此要減少磷肥用量，而且要早點施下磷肥，以促進早期根部的發育，使其

抗風的能力，同時避免攝取吸芽，以免弄鬆土地

聽到了颱風預報時提早收穫。原料甘蔗則要提前培土及整理大小排水溝，提前剝掉枯乾的甘蔗葉，

蔗莖高的蔗園，應該搭竹架支柱，以防倒伏。

香蕉必須插立支柱，平時多施鉀肥，以增強