

(3) 直播旱田藥劑處理

表三	每公頃用藥量	稀釋數	施藥時期
50%殺丹乳劑 掃丹 (Saturn)	8~10 (公升)	100	雜草 1~2 葉時 (播種後第一期約 5~7 日, 第二期約 3~5 日)

(4) 直播濕田藥劑處理

表四	每公頃用藥量	稀釋數	施藥時期
50%殺丹乳劑 掃丹 (Saturn)	6~8 (公升)	100	雜草 1~2 葉時 (播種後第一期約 5~7 日, 第二期約 3~5 日)
5%丁基拉草 粒劑 馬上除 (Machete)	40 (公升)		秧苗本葉一葉時 (播種後第一期約 5~7 日, 第二期約 2~4 日) 施用半量。再二葉時 (播種後第一期約 5~7 日, 第二期約 5~7 日) 施用半量。

- 馬上除施藥時田面保持濕潤狀態。
- 馬上除施藥後僅用濕潤灌溉，不可積水。

③第二期作稻田的施藥時間在高溫下，其雜草的萌芽及生育力均較第一期作快。因此，第二期作的施藥時期就播秧後日數而言，須較第一期作提早，而中間作稻田按照第二期作的日數施藥即可。

(3) 田面須保持適當的水深度淺，藥效

勵行淺播。

①應採用適當秧齡及生育健全的秧苗。

②插秧深度須均勻，並不宜深播，避免藥害的發生。

施藥時

(1) 預先修補田埂堵塞漏洞，以預防漏水提高田面保水力。

(2) 徹底把握施藥適期施藥：

①各種藥劑由於其具有特性，因此，各種藥劑的施藥適期不相同，必須按照其指定的適期施用，不宜任意提早或延遲。

②雜草的發芽及生育，受氣溫等氣象環境的影響很大，如遇到不正常氣候時，其萌芽及生育均有變化。因此施藥時期，須視田面雜草實際發生情形而定。

施藥後

(1) 注意灌溉排水管理：

①在移植或機插稻田，施藥後田面須保持三、五公分深積水，經過三五日或十日後才可恢復一般管理。如水深減低應補充，遇到降雨超出深

差，過深易引起藥害。

②積水的深度通常為三、五公分，但秧苗新葉伸出點不宜浸入水中，尤其在機插稻田須特別小心。

③直播稻田須在排水狀態或保持濕潤狀態下施藥，田面不可積水。

(4) 須按照指定藥量施用，而且撒布須均勻。

①減量施藥殘效性差，超量施藥易引起藥害且不經濟。

②撒布密度疏，殺草效果差，過密易引起藥害。

信譽的標誌



圓方牌農藥

針對稻熱病兩大剋星！

稻強液劑 2% (カスミン)

喜樂生乳劑 48% (キタジン)

浮塵子、飛蝨類之特效藥！



允速靈 AZODRIN 60 S

滅米蝨 MIPC 50 W.P.

滅蝨 CPMC 50 W.P.

允發農化工廠有限公司 台北市東園街 101 巷 99 弄 11 號  
TEL. 336549 · 370288