




荔枝腫葉病（初期）

荔枝葉片與新梢對藥劑的反應很敏感，不宜使用夏油乳劑。

③荔枝卷葉蟲：荔枝新梢常有卷葉蛾在嫩梢或嫩葉間，吐絲作繭，將嫩梢或嫩葉結合，或將嫩葉卷起，藏身其間產卵。

孵化後的幼蟲食害嫩梢或嫩葉，常很嚴重，可噴布馬拉松或速滅松等防治。

④毒蛾：幼蟲體被長毛，於高溫多雨季節或新嫩發生時期，散布極為迅速，食害嫩梢，都很嚴重，可噴布馬拉松防治。

⑤木蠹蟲：幼蟲常蛀入枝幹木質部，形成隧道，常致枝幹枯死。應在枝幹表面，噴布地特靈或速滅松，防止成蟲在皮下產卵，以免孵化後的幼蟲向木質部侵入。

噴藥時期以乾季開始的十月與雨季開始前的四月為最適宜。

⑥天牛：台灣各地荔枝常可發現枝幹皮部，成環食害情形，嚴重者可使枝幹或整個樹體枯死。原因為天牛在皮下產卵，孵化的幼蟲，環繞枝幹蛀食皮部，切斷韌皮部的運輸道路，致根部營養耗盡，即餓而死。

防治方法與防治木蠹蛾相同。

⑦荔枝果蛀虫：此虫在荔枝果實開始着生至果實成熟期間，不斷在果實表面產卵。

孵化後的幼虫，侵入果實內部，致使果實脫落。宜自花期結束開始，至果實成熟期間每十天噴布一千倍的速滅松或力拔山一次。

防止成虫產卵，或毒殺其幼虫，即可避免為害。

⑧金龜：於荔枝果實發育近成熟期，喜吸吮果肉汁液，使果實裂開，以致脫落，為害常很嚴重。可噴布馬拉松防治。

果實發育期間按時噴布速滅松或力拔山者，無此為害。

⑨椿象（臭屁虫）：為害情形與採收不同，遲早各異。

防治方法與金龜同。

採收 台灣荔枝的成熟期，因栽培地區與品種的不同，遲早各異。高雄、屏東一帶氣溫稍高，成熟期較台中可早十天左右，高雄早生與玉荷包兩品種，成熟特早，每至陽曆五月中旬，即可充分成熟，黑葉則應至六月上旬採收。

但果商為爭取市場價格，常提早採收，則風味較差。

台中一帶荔枝的成熟期，紅皮為六月上旬，中旬，黑葉為六月中旬至七月上旬。

新竹一帶成熟期又較晚，黑葉採收期可延到七月中旬。

採摘荔枝果穗時，應注意折取果穗的部位，如僅在果穗基部折取，不傷及該部枝條的芽體，則果穗採收後，將迅速發出新枝，這些新梢至翌年春季，又可能產生花序而繼續結果。

否則，翌年即沒有結果希望，因而影響翌年產量。

一般果農採收時均甚疏忽，為求工作便利，常將枝條任意折斷，這對次年產量影響很大，應加注意。

魚餌絲蚯蚓繁殖

• 王文政 •

無性生殖。

(一)絲蚯蚓是以卵繁殖的，但也有無性生殖。

(二)繁殖多在水下或其他有機物豐富的軟泥，且有緩流經過的地方。

(三)如蓄養，可把絲蚯蚓放在大臉盆內，以自來水流過即可。

用木架做槽，放入曾有絲蚯蚓繁殖的泥土，約五、六公分，需有三、六公分的水層。

將蚯蚓置於陰暗處即可，最適水溫為二五、三〇度C，酸度六、八。並可加入稻草、木片作媒體供附着。氧氣不可缺少，因此飼料不可放過多。

飼料比例為澱粉十，小麥粉五，高粱粉三，魚粉二，經粉碎後將粗粒除去，然後放入泥中（深約二公分為宜）。放入量約為每日總重的二%。飼料過多或泥土過久，會在表面形成薄膜，此時需除去，並添加新泥。



高雄早生種子