

鼓勵市民：

利用空地種植短期蔬菜

……華視農村曲 八月七日播出

農復會植物生產組

每年夏季，台北市的蔬菜市場都面臨極大的壓力，一方面因為台北市有兩百多萬的人口，本身的耕地有限，因此每日所需的新鮮蔬菜都依賴鄰近鄉鎮及中南部的供應。

如果每人每日平均所消費的蔬菜量為二〇〇克計算，則台北市每天需要大約四百公噸的蔬菜。這數目可說不小，且有繼續增加的趨勢。

在另一方面來說，各地蔬菜在其他季節中產量足夠，供應台北市並無困難，但一旦進入高溫多濕的夏季，許多蔬菜由於生理上的障礙，就無法做良好的生長與發育，不僅育苗困難，病虫害發生也多。

因此，在蔬菜的種類上就有了很大的限制，再加上夏日雷雨對葉菜類會造成嚴重的損傷，更減少可栽培的種類。

同時高溫更助長病虫害的發生及蔓延，尤其颱風來襲，又摧殘本來就不多的蔬菜。阻斷交通，加上蔬菜，尤其是葉菜類天生不耐儲藏，因此市場這時無法迅速補充，於是夏季蔬菜缺乏。

為此，並遵照蔣院長指示，政府有關單位決定了解決夏季蔬菜缺乏的幾個方針。首先，設置示範圃四十處，共八百公頃，以示範的方式，改進

農民的生
產技術，
以達增加
產量的目
的。

其次

獎勵高冷
地種植蔬
菜，避免

溫度過高的困難，以彌補颱風季節缺乏之不足。

第三、獎勵塑膠網室蔬菜栽培，一方面減少颱風、日晒、乾旱及雷雨的損害，並可減少病虫害，使質與量並重改進。

第四、加強產業道路及灌溉設施的修建，以利生產及運輸。

第五、加強病虫害的防治。

第六、也是和台北市民最有密切關係的，就是一鼓勵市民利用空地種植短期蔬菜，以減少市場的負擔，同時可減少台北市民對市場供銷的依賴性，進而調節蔬菜的來源。

在颱風來襲，外地蔬菜無法進入台北市市場時，台北市民仍有新鮮價廉的蔬菜可供食用。

同時市民亦可利用休閒之時培養種蔬菜的雅趣，亦可做為美化環境的材料，更有益於身心，一舉數得，實為鼓勵市民利用空地種植短期蔬菜的目的。

接受鼓勵的對象是台北市的市民而非菜農。為了避免成為營利，每位居民的種植空地面積將不超過〇・〇一公頃，當然，沒有空地的居民亦可利用陽台或其他空間種植。種植的方式更可分多次實施，並不因空間太小而有困難。

更可利用木箱或其他容器來栽培，這些方法都請台北區農業改良場做明確的示範。

由於今年首次實施，蔬菜的種類先選定黃金白菜一種，不僅容易栽培，而且栽培期短，可以很快的有所收穫，同時也是營養可口的蔬菜。種子及肥料都是贈送市民的，可向區公所及區農會申請發給。

市民栽培蔬菜期間可能遭遇到一些技術上的困難，這些困難都可向由台灣大學及台北市農工職校有關科系學生組成的服務隊請求解決，服務隊並負有配合各區農會及區公所人員追蹤輔導之責，以收效果。

預定實施的地區雖然只包括木柵、景美、南港、內湖、汐園、松山、

菜苗間拔（莊能雄）



大安、古亭、中山、大同、士林及北投等十二區，但不屬這些區而有興趣的市民，可就近向區公所或區農會申請種子及肥料。

因此，只需要市民自己動手，就可以有收穫，而勤加管理是蔬菜栽培成功的秘訣，也是防止病虫害最好的方法。



因為本計畫的目的不僅在利用空地以充裕夏季蔬菜的來源，更有提高市民栽培清潔蔬菜的興趣，以及食菜的衛生安全，因此，應盡量避免使用農藥。

事實上，市民最大的收穫應是欣賞自己栽培蔬菜欣欣向榮的喜悅，以及享用自己種出的蔬菜了。

黃金白菜澆水（莊能雄）



本田引擎



本田引擎之特點

規格：

	G42	G65
引擎型式	空冷四衝程	空冷四衝程
總排氣量	170c.c.	240c.c.
馬力	4.5HP (馬力)	6.8HP (馬力)
引擎重量	18公斤	29公斤
燃料箱容量	4.5公升	6公升
潤滑油容量	0.57公升	0.75公升

- 使用輕便，發動簡單，老幼皆可使用。
- 用途廣泛，可供抽水機、脫谷機、噴霧機、遊艇、運輸暨各種機械之動力裝置使用。

台灣總代理：

豐達行

台北市博愛路26號
電話：366280·330467

適宜都市空地栽培的：

黃金白菜

莊能雄

一般栽培法

(1) 採用直播栽培：黃金白菜生長迅速，淺根性而質地柔嫩，在夏天不適移植，一般採用直播栽培。配合家庭人口需要，土地大小，可以每

(華視農村
曲八月七日播
出)：
農復會與台北市政府正在鼓勵市民於夏季蔬菜缺乏時期，利用空地種植短期蔬菜，並免費贈送黃金白菜種子及尿素肥料。現將黃金白菜栽培要點說明如下：

隔一星期或十天分期分批播種一次。一厘地約需種子五十克，播種前將土地打碎，在地勢高不積水地區作寬廣平畦，低窪地區宜作高畦，整個畦面須平整無凹凸，使排水良好。用撒播，播種後覆土○·三○·五公分，最好再以稀薄稻草覆蓋（無稻草可不必覆蓋）以防雨水冲刷。發芽時可任其從稻草間隙中長出，此層稀薄稻草即留作畦面覆蓋之用，如此可保護其初期的生育。

(2) 十月以後不宜播種：黃金白菜耐熱性強，適宜夏季栽培，十月以後溫度降低，播種後有抽苔現象，應避免播種。如需種植，十月以後應採用圓葉山東小白菜取代。

(3) 不要以尿素作基肥：尿素濃度高，不可做基肥，以免妨碍種子發芽。

(4) 注意間拔：黃金白菜生長迅速，必須間拔。播種後一周本葉生長時，施行第一次間拔，將過密、徒長、畸形者都拔除，保持距離三○四公分。在播種後約二星期本葉三枚時，行第二次間拔，也是最後一次間拔，保持距離十○十二公分四方一株，此時間拔的幼苗可供食用。

(5) 早晚注意澆水：黃金白菜淺根，如土壤太乾燥生育不良，影響產量及品質，也容易發生蚜虫及黃條葉蚤等害虫為害。夏天栽培尤須注意早晚澆水，早上澆水時間最好在八點左右，傍晚澆水在五點鐘以後。如遇雨天，雨後注意不使積水，否則久浸水中，根部窒息易致枯死。

(6) 注意肥料使用：直播栽培施用追肥，可將尿素撒施畦面，然後澆水沖洗葉面粘附的肥料，以防肥傷

。也可在澆水時添加○·五%尿素行葉面施肥。追肥時間第一次在播種後十天，第二次在十五○二十天。

(7) 虫害防治：為保障市民安全，避免農藥殘毒，盡可能不使用農藥，如需使用，應照市政府規定使用低毒性農藥二氯松（DDVP）。

(8) 適時收穫：黃金白菜收穫可依其生長情形及株間密度，在植株尚未抽苔之前隨時採收。

木箱栽培法

在鬧區缺乏空地的市民，也可利用陽台及屋頂使用木箱栽培，木箱大小長寬可隨地形調整，但木箱深度在夏天以十二公分以上較好。木箱栽培為便於疏苗管理，以採用條播行距約十公分，其餘栽培管理可參考一般栽培方法。