



本田引擎



本田引擎之特點

規格：

	G42	G65
引擎型式	空冷四衝程	空冷四衝程
總排氣量	170c.c.	240c.c.
馬力	4.5HP (馬力)	6.8HP (馬力)
引擎重量	18公斤	29公斤
燃料箱容量	4.5公升	6公升
潤滑油容量	0.57公升	0.75公升

- 使用輕便，發動簡單，老幼皆可使用。
- 用途廣泛，可供抽水機、脫谷機、噴霧機、遊艇、運輸暨各種機械之動力裝置使用。

台灣總代理：

豐達行

台北市博愛路26號
電話：366280·330467

適宜都市空地栽培的：

黃金白菜

莊能雄

一般栽培法

(1) 採用直播栽培：黃金白菜生長迅速，淺根性而質地柔嫩，在夏天不適移植，一般採用直播栽培。配合家庭人口需要，土地大小，可以每

(華視農村曲八月七日播出)：
農復會與台北市府正在鼓勵市民於夏季蔬菜缺乏時期，利用空地種植短期蔬菜，並免費贈送黃金白菜種子及尿素肥料。現將黃金白菜栽培要點說明如下：

隔一星期或十天分期分批播種一次。一厘地約需種子五十克，播種前將土地打碎，在地勢高不積水地區作寬廣平畦，低窪地區宜作高畦，整個畦面須平整無凹凸，使排水良好。用撒播，播種後覆土○.三~○.五公分，最好再以稀薄稻草覆蓋（無稻草可不必覆蓋）以防雨水冲刷。發芽時可任其從稻草間隙中長出，此層稀薄稻草即留作畦面覆蓋之用，如此可保護其初期的生育。

(2) 十月以後不宜播種：黃金白菜耐熱性強，適宜夏季栽培，十月以後溫度降低，播種後有抽苔現象，應避免播種。如需種植，十月以後應採用圓葉山東小白菜取代。

(3) 不要以尿素作基肥：尿素濃度高，不可做基肥，以免妨碍種子發芽。

(4) 注意間拔：黃金白菜生長迅速，必須間拔。播種後一周本葉生長時，施行第一次間拔，將過密、徒長、畸形者都拔除，保持距離三~四公分。在播種後約二星期本葉三枚時，行第二次間拔，也是最後一次間拔，保持距離十~十二公分四方一株，此時間拔的幼苗可供食用。

(5) 早晚注意澆水：黃金白菜淺根，如土壤太乾燥生育不良，影響產量及品質，也容易發生蚜虫及黃條葉蚤等害虫為害。夏天栽培尤須注意早晚澆水，早上澆水時間最好在八點左右，傍晚澆水在五點鐘以後。如遇雨天，雨後注意不使積水，否則久浸水中，根部窒息易致枯死。

(6) 注意肥料使用：直播栽培施用追肥，可將尿素撒施畦面，然後澆水沖洗葉面粘附的肥料，以防肥傷。

(7) 虫害防治：為保障市民安全，避免農藥殘毒，盡可能不使用農藥，如需使用，應照市政府規定使用低毒性農藥二氯松（DDVP）。

(8) 適時收穫：黃金白菜收穫可依其生長情形及株間密度，在植株尚未抽苔之前隨時採收。

木箱栽培法

在鬧區缺乏空地的市民，也可利用陽台及屋頂使用木箱栽培，木箱大小長寬可隨地形調整，但木箱深度在夏天以十二公分以上較好。木箱栽培為便於疏苗管理，以採用條播行距約十公分，其餘栽培管理可參考一般栽培方法。