


種植香蕉

五十年經驗！

由中鎮大崙里大安路73號 張森泉



香蕉中耕除草 (張宗藩)

我家栽培香蕉已有五十多年的歷史了，全家食衣住行全靠香蕉收入來維持。

我認為種植香蕉一定要注意每年颱風季節來臨時的損失。若能把握適當時期，注意栽培管理，就可避免或減少颱風侵襲的損害。如果不注意栽培管理，疏於疏果、套袋、灌水及病虫害防治，則栽培香蕉勢必虧本。

目前台中地區青果社實施契約保證蕉價，使蕉農們更能專心從事生產。

現將我家種植香蕉五十年來的經驗，提供出來，供大家做參考：

(1) 選擇土地：香蕉栽培地，除排水不良地區外，任何地方都可以栽種。

(2) 整地及種植：分為兩期種植。

① 清明前後：採用冬至前留芽的蕉苗，把去年收後的田園耕犁細碎，休閒一二月後，作好畦，自畦溝地面掘穴種植蕉苗，覆土至苗頭，不可太深也不可太淺。

② 秋分前種植：採用清明後留芽的蕉苗，把田園耕犁細碎，作八台尺寬的畦，畦上掘穴種植香蕉。蕉株間播種田菁，可以防除雜草的生長，及用作綠肥。

(3) 選苗：因地區及氣候而不同，苗部約三、四台尺，尾尖而頭大者為良好之苗。應採用沒有萎縮病的蕉株。

(4) 施肥：施肥量是否適當，是香蕉栽培上最重要的一項，在種植一、二個半月時施肥一次（用單質肥料如尿素、硫酸）作追肥，（最好種植前在穴內施少數細堆肥為基肥，可保溫及促其提早生根）。

後每隔一、二月施肥一次（約五、六次，為掘穴式施肥法）。

每灌水二次須要地面施肥一次（用單質肥料撒施方式）作速追肥，施肥量隨各地方土質、氣候而有不同。

(5) 除草：田間種植香蕉後，最好不要種任何作物（綠肥除外），並視雜草生長情形分二、三次（最好噴洒除草劑一次）除草。

(6) 培土：培土兩次，①第一次在香蕉成長情形下約三月內培土一次，香蕉成長到五、六台尺高時，第二次培土（大培土），並拔去蕉園田菁放在畦下，兩邊施肥，用牛犁中耕。

(7) 留芽：香蕉留芽可分為兩種：①移植者要在立冬後留芽。②栽培宿根夏秋蕉要在四、五月間（立夏）留芽最理想。

(8) 插立支柱：採用防腐支柱，香蕉成長到五、六公尺（新植者在大培土後）要插立支柱，可減少蕉株受風搖動，影響香蕉成長，尤其颱風季節來臨前，蕉農更應全部插好支柱，以減少損害。

(9) 病虫害：新植及宿根栽培，病虫害防治方法稍有不同。

① 新植：第一次施肥後，用地特靈粉劑噴洒蕉園。第二次在大培土後，第三次在抽穗前兩月間。② 宿根栽培，在冬至前及立春、清明時各噴藥一次，防治病虫害。

(10) 套袋：在香蕉抽穗後約成熟三分多時要套袋，可保蕉果色澤及虫害，提高品質。

(11) 收刈：在香蕉成熟到七、八分時採收。要控制熟度，須要在每月的三旬（上、中、下）寫下日期作刈蕉參考。

(12) 搬運：香蕉採收後的搬運，可控制品質，提高合格率，是最後一個階段的工作，若不小心，將影響香蕉品質。

最好用拖車以棉被一層香蕉一層裝好後，運到檢收場，可保香蕉良好的品質。

此外對於香蕉外銷方面，我也有一點意見：每年到香蕉生產旺季，即發生運蕉冷藏船不夠的問題，使蕉農辛苦生產出來的香蕉，任其腐爛廢棄，無論國家或蕉農多遭受很大的損失。希望今後對運蕉冷藏船能及早準備。

