



南瓜肥培管理

〔問〕：(一)南瓜自播種至收成要多久？

(二)堆肥與化學肥料各施多少？施肥時間怎樣分配最適當？

(三)灌溉要領如何？

(四)有病害噴撒什麼農藥好？

(五)噴何種殺草劑最好？

(六)其他管理上應注意那幾點？

屏東東港鎮大潭里九五號蘇清文

〔答〕：春播(四月)下種至收成約需六十五天，夏播(七月)者約需五十天。

(一)每十公畝施肥量如下：

堆肥 一二〇〇~一五〇〇公升

硫酸銨 二五~二六公升

過磷酸鈣 二五~三〇公升

氯化鉀 八~一〇公升(以上為基肥)

硫酸銨 六~八公升(分二次)
氯化鉀 五~八公升(一次)
豬糞尿 五〇〇~六〇〇公升(一次)(以上為追肥)。

(二)灌溉次數視天氣而定，如繼續不下雨，四~五天行畦溝灌溉一次。

(三)露菌病宜噴射大生四十五可濕性粉劑四百倍液，白粉病宜噴射可利生一千倍液，守瓜宜噴撒養文八百倍

天堂之鳥

〔問〕：(一)天堂鳥的學名為何？

(二)生態及型態如何？

(三)怎樣施肥？

(四)病虫害如何防治？

(五)原產地及分布地區如何？

(六)如何育苗、定植、管理？

(七)經濟價值如何？

(八)如何選擇品種？(台中市水瀨大石三巷二〇號吳志華)

〔答〕：(一)天堂之鳥學名：Strelitzia Reginae, Banks.

(二)形態：單子葉芭蕉科多年生草本植物，植株高三尺，葉有葉柄、革質、卵圓形，上有白粉，長約一尺。

夏季開花，花黃紫色，蝎尾狀聚繖花序，排列似鳥的頭部，花下有苞狀苞片。莖片為披針形，雄蕊五個，子房三室。種子不規則呈黑褐色。

(三)施肥方法：環狀溝溝施用肥料為主，化學肥料為輔，每年施用四~五次。

(四)病虫害防治

液，瓜蠅宜噴射二五多馬拉松可濕性粉劑，加用可溶性蛋白質四百倍液(雌花着生後才開始噴射)誘殺。

(五)拉草較適宜，每十公畝需一〇〇CC，加水七〇~八〇公升噴洒畦面。

(六)母葉本葉四~五葉時摘心，留子蔓三~四條，子蔓四〇~五〇公分時再行摘心。(王進生)

魚池防漏

〔問〕：(一)新開掘兩口魚池，其中一口深約二·五公尺，底部為沙石，雖經大雨及放水，但始終不能儲水，如何補救？

(二)新開魚池約三分半左右，以混養何種魚較好？數目各若干？(我的農場以養豬為主，將來擬利用豬糞作為魚飼料)，在技術上應注意什麼？(桃園龜山陸光路五九號楚志武)

〔答〕：一般魚池以泥底較好，你的魚池底部為沙石，不易保水，你可填舖一層泥土，再注水一公尺左右，放養一些較大的鯉魚。因鯉魚多在池底攝食底棲動物及有機物碎片，且有挖底泥取食的能力。

經過一段時間，底泥受鯉魚的游動和挖掘，攪拌成泥漿，自然就不會漏水了，或者注水一尺左右，再利用人工去攪拌成泥漿也可以。

(三)所開魚池擬利用豬糞養魚，可放養福壽魚、鯉魚、鱒魚、鯽魚、鰱魚等。放養量為福壽魚三、〇〇〇~四、〇〇〇尾，鯉魚三〇〇~五〇〇尾，鱒魚六〇~一〇〇尾，鯽魚五〇〇~一、〇〇〇尾，鰱魚一、〇〇〇~二、〇〇〇尾等。

以上魚苗，除福壽魚、鰱、鯉魚外，以大型魚苗為準。

養魚池水對魚類的影響很大，應設法保持良好的水質。在夏季的清晨，或無風悶熱的傍晚，魚容易發生浮頭現象，所以每日清晨，必須巡視預防。

附註：若經濟能力許可，也可以鋪塑膠布後再舖一層泥土，則效果更好。(彭弘光)

治：撒布大生及馬拉松防治。

(二)原產於非洲南部，現在熱帶地方均有栽培。

(三)熱帶地方春季苗床播種，苗高十數公分移於盆栽，以後更換大盆。露地栽培株距一公尺，也可於春季用分株法繁殖。天堂之鳥花喜好高溫，充分的陽光及稍潮濕富含有機質的壤土。冬季攝氏五度越冬。

(四)種苗向彰化員林中正路玫瑰花推廣中心洽購，小苗每株二·五元，大苗每株一百元，多購時有優待。

(五)品種選擇：本省現有兩種，一為矮性早開種，植株高二尺左右，葉較短，花期早。一為高性晚開種，植株三尺左右，花期較晚。(呂淑濤)

〔問〕：(一)水蚤如何繁殖？

(二)雌魚產卵後，何時隔離？

(三)剛出生的魚苗，是否要給食？水族館出售如髮絲的虫叫什麼？是不是水蚤？(魏深南)

〔答〕：(一)水蚤的繁殖方法：將池水排乾，先撒布生石灰於池中的各角落，再施下雞糞及醬油粕。經曝曬數日後注水一尺左右，再經三~四日，待池水轉綠後再多次注水，大約十二天即能繁殖出水蚤。每坪施雞糞、生石灰各一公斤，醬油粕一·五公斤。

(二)雌魚產卵受精後，就要把種魚隔離，或將受精卵取出放於孵化池孵化，否則受精卵及孵化出的魚苗，會被種魚吃掉。

(三)剛出生的魚苗不需給餌，待二~三天後，即可以煮熟的蛋黃，加水碎成漿後餵飼。水族館出售的叫絲蚯蚓，不是水蚤。(彭弘光)

印章非本人使用 法律上不生效力

彰化田中鎮員集路陳
欽造先生來信：
甲乙兩兄弟已經分居，父親由乙扶養。現在甲偷用父親的印章向外借款，父親催他歸還，始終不理，登報聲明作廢是不是有法律上的效力？
甲盜用印章所借的債務，父親不知道，是否要負責清償的責任？
父子各別的債務，有沒有互相代還的義務？

警察電台法律顧問胡顯律師
答覆：

(一)甲沒有得到父親的同意，偷用父親的印章向外借款，他父親不必負責，同時還可以控告甲盜用印章的罪。
登報聲明作廢是可以的，但是，印鑑不發生效力，主要的是印鑑並不是由本人所使用。如果是本人所使用的，雖然登報，也不能發生作廢的效力。
(二)父子在同一個戶籍裡面，各別借債，要各人自己還，沒有相互代還的責任。

桃園郵政第七四四五附三六號
吳文助先生問：

什麼叫做直系血親、直系姻親、旁系血親、旁系姻親及五親等、八親等？如果輩分不同，在第七代是同一個祖宗，能不能結婚？
警察電台法律顧問商維律師



答覆：

(一)生自己的和自己所生的血親，叫做直系血親，比如父母、祖母、曾祖父母、子女、孫子女等都是。
與自己出於同源的，叫做旁系血親，比如兄弟姊妹、伯叔姑母、姪子、姪女等是。
血親的配偶，配偶的血親，和配偶血親的配偶，都叫做姻親，比如兄弟的妻子，姊妹的丈夫、妻子的兄弟姊妹等都是。

(二)五親等與八親等的區別，是用親等的總系數來計算的，比如同族的兄弟姊妹，和外族的兄弟姊妹，都是屬於旁系血親八親等以內的。五親等以內的是堂伯叔、堂姑、外堂伯叔、堂姑、堂姪、堂姪女、外堂姪和外堂姪女。

凡是民法第九八三條規定的親屬，都不能結婚。照來信所說的情形，是在八等親以內，而且輩分不同，是不可以結婚的。
台北市蕭毅成先生問：役男申請提前入營，在入伍令上配發的兵科為工兵，與原核的特種兵不同，像這種情形，可否申請改發為原審定的兵科？
省政信箱答覆：社會青年提前入營者，任職與所選擇兵科不符時，可向服務單位申請調整。

八親等內血親 民法禁止通婚

鱧魚適應力強

殖？


[問]：(一)鱧魚適合何種池塘養殖？
(二)一分地的池塘，可養多少魚？
(三)如池中已放養鱧魚及其他種魚，應如何施肥？
(四)鱧魚按大小日給多少餌料？
(五)鱧魚疾病如何預防？
(六)鱧魚索食何種餌料？
(七)鱧魚苗以幾寸放養為宜？幾時放養最為適當？
(八)如何充裕鱧魚餌料？
(九)鱧魚依其大小，能吃多大的魚？
(十)花蓮玉里鎮東園街六號侯晉臣？

[答]：(一)鱧魚又名鱧魚，喜棲息於污濁止水處，所以對於水質及溫度的外界變化，適應範圍極廣，攝氏 $10\sim35$ 度水溫均能生存。
(二)鱧魚放養時，要視池塘環境、管理及市場所需大小而定，一般每平方公尺放養數，全長為三、五、七、一〇、一五、二五公分者，各為一〇〇、五〇、二〇、一〇、五、三尾。
(三)鱧魚為肉食性，喜食活的小動物，魚漿也為餌料之一，施肥與否，則要看池中放養的魚類而定。
(四)鱧魚給餌量，每天為其體重的 $5\sim10\%$ 。
(五)鱧魚疾病，一般為爛尾、鰓腐及白點病。
(六)爛尾病、口腐病、鰓腐病——以魚體重的 0.2% 多藥滅淨或泰滅淨餵混合於餌料中餵飼，連續 $5\sim7$ 天，停止投藥十天後再投藥 $5\sim7$ 天。
(七)白點病——以五萬分之一濃度的甲基藍，浸浴數天。

呂淑濤)

(九)鱧魚喜食活的小動物，可以魚漿為補助食餌。
(十)放養鱧魚以二寸以上，四月放養為宜。

(一)可繁殖鱧魚苗，與郭魚苗、鯽魚苗，以增加食餌。
(二)鱧魚可吃多大的魚，不能一概而論。根據文獻記載，體長三四公分的魚胃中，曾發現十八公分長的鱧魚。(彭弘光)



含笑花繁殖

[問]：含笑花如何栽培？(中縣潭子鄉甘蔗村水巷二九號林玉琦)
[答]：(一)學名：Michelia fuscata, Blume。
英名：Banana Shrub。
(二)原產於中國。
(三)春季行空中壓條繁殖。
(四)栽培管理：空中壓條的當年秋季或第二年春季，將母樹上空中壓條的新苗剪下，栽於花盆，或庭園露地的新苗剪下，栽於花盆，或庭園露地。喜溫暖向陽地方，通風的半陰處適可以栽培，排水良好的粘質壤土較適宜。

有風的地方宜立支柱，每年春秋各施肥一次，夏季注意灌水。一年中耕除草三、四次。每一、二個月撒布大生及馬拉松各一次，以防止病虫害發生。
含笑自然樹形美觀，不需修剪整枝，但枝葉過於繁茂時，酌將密集處雜枝加以修剪，使通風並受陽光照射，可生長良好，減少病虫害發生。(呂淑濤)