



蔬菜採收

新引進的蔬菜五種

政府為發展農產品加工，積極引入新的蔬菜種類及品種，尤其是國際市場需量大，價值高，並能適應本省天然環境者。

目前已有五種新的蔬菜，分別由農復會及農林廳引入，正在擴大試種。這五種蔬菜是黑皮婆羅門參、黃秋葵、朝鮮薊、小胡蘿蔔、和小洋蔥，都是很有外銷前途的蔬菜，不過仍然有待進一步的試驗，才能推廣栽培。

黑皮婆羅門參

黑皮婆羅門參(Black salisfy, *Scorzonera hispanica*)：為菊科，二年生，原產中歐及南歐，食用部分為地下儲藏根。皮為黑色，內為白色，長度約二〇~四〇公分，因耕作方式及品種而不同。

本省適合的栽培期為九月~十一月

蘇慶華

公分為宜，耐寒性極強，而且少有病虫害。

黑皮婆羅門參主要目的在加工製罐，主要市場為西德，生食時可用清水浸後煮熟食用，可除去苦味。

目前推廣情形只限於台南改良場的試驗栽培，已獲得初步成功，並希望在今年擴大栽植面積。

朝鮮薊

朝鮮薊(Artichoke, *Globe artichoke*, *Cynara scolymus*, L.)

：朝鮮薊亦為菊科多年生常綠性作物，原產地中海沿岸，葉大而多肉，綠色，遍生白色軟毛，葉緣有深刻，葉尖有刺，食用部分為花蕾及葉柄。

花蕾扁平或呈球形，未開放時肉質柔韌，富含澱粉，在生長二年後每年四月抽苔，可長達三~四英尺，至

，採收期為一月~三月，土壤要求與根菜類相似。每公頃產量大約在八〇〇〇~一〇〇〇〇公

斤。種子相當大(一×〇·二公分)，行株距以二〇~二五、十

五~二〇公分為宜，耐寒性極強，而且少有病虫害。


最新型、最安全、最經濟又有效的
微生物殺虫劑

百克 (BIOTROL® XK)

北市農藥字第1291號

防治吊絲虫、擬尺蠖、紋白蝶、毛虫類及其他青虫類最佳利器。

無毒害、無藥害、無公害、無殘留毒性，最重要的——不產生抵抗性，可連續使用。



THOMPSON-HAYWARD CHEMICAL CO.
代理：德城行有限公司
總經銷：嘉泰企業股份有限公司
地址：台北市仁愛路三段26號二樓
電話：776815

1. 百克必須被吃到底



2. 結晶狀毒素使害虫內臟癱瘓(麻痺)



3. 害虫不能再吃了一它的危害停止





4. 不多久一害虫死了！



5. 不用愁——在害虫最後幾天生命裏，它是一隻“好虫子”它不再危害作物，因為它不能吃了。

詳細說明書函索即寄

本田引擎



本田引擎之特點

規格：

	G42	G65
引擎型式	空冷四衝程	空冷四衝程
總排氣量	170c.c.	240c.c.
馬力	4.5HP (馬力)	6.8HP (馬力)
引擎重量	18公斤	29公斤
燃料箱容量	4.5公升	6公升
潤滑油容量	0.57公升	0.75公升

- ☑ 使用輕便，發動簡單，老幼皆可使用。
- ☑ 用途廣泛，可供抽水機、脫谷機、噴霧機、遊艇、運輸暨各種機械之動力裝置使用。

台灣總代理：

豐達行

台北市博愛路26號
電話：366280·330467

六月其頂生花蕾，開花為紫色。除花蕾外葉柄亦可食用，但應先行軟化，具有蘆筍的風味。

朝鮮薊喜溫暖乾燥的氣候及排水良好之地，如天氣太熱，花蕾易開裂，影響食用部的柔軟。繁殖可用分株根插或實生，都可在三、四月間實施，一般四年更新一次，每株每次收穫可得花蕾十餘枚。

於三年前引入，目前在台北及新竹改良場均有試種，但因氣溫太高，品質不好。因此應用育種方法選出適合本地的品種，除外並希望在高冷地種植。朝鮮薊亦用為製罐，主要市場是法國。

黃秋葵

黃秋葵 (Okra, Hibiscus esculentus)：喜好高溫 (二八度 C 以上)

嫩莢可供食用，種子可榨油，是生食、冷凍、加工均可的蔬菜。

一年生草本，本省適合夏季種植 (栽培情形參閱豐年二十卷九期四二~四三頁)，各改良場都有試種，但以南部地區為宜，目前因為產量較低，且生產期較短，仍在試驗階段。

小洋蔥

小洋蔥 (Small onion, Allium cepa)：五十五年由荷蘭引入八品種，經試種之後，有三品種 (Pompeii, Jols, San Joaquin) 結球率較高 (八五%以上)，葱球的大小大約為二·三公分×一·五公分，重量平均在四~五公克。目前新竹改良場正在進行初步的栽培試驗，希望能引入更多品種參加試驗，以做為推廣的依據。小洋蔥可供脫水外銷。


小胡蘿蔔

小胡蘿蔔 (Ting carrot, Daucus carota)：民國五十七年農復會從荷蘭引入兩品種，Parisier mark 和 Warrel Parisische。

由於平地不抽苔開花，必須有低溫 (攝氏一六~二〇度) 及長日照 (十四小時)，才能有飽滿充實的種子，因此，小胡蘿蔔採種的工作必須在高冷地進行。

可栽培在平地西海岸，土壤鹼度 PH 六~七微碱性的沙質壤土，水田冬季裡作可在十、十一月播種，五〇天可收穫，不影響第一期稻作，因此值得大量推廣。

但因採種問題未完全解決，因此仍未推廣栽培，目前正由新竹改良場試驗種植中。



黑皮波羅門參 (陳榮五)