

金線蓮

劉連勝



金線蓮，為台灣珍貴的藥用植物之一，外銷價格很高，每年供不應求，野生的金線蓮已幾乎被採盡，若不加以保護栽培，恐怕有絕種的危機。

多年草本植物

金線蓮為多年生草本植物，屬於蘭科，高約二十公分，莖圓筒狀，常多分支，肉質。葉互生，平滑，全緣，表面暗綠色，主脈五條，具有細小的金黃色網狀支脈，在陽光下閃閃發亮，非常美觀，因而得名。背面粉紅色，卵形或圓卵形，先端銳形，基部闊形，長約五公分，寬約三公分。

早春開粉紅花，總狀花序，開花數朵，花軸有毛，苞卵狀披針形，後萼片圓形凸頭，與二瓣片形成兜狀；側萼片卵狀長橢圓形。瓣片半卵形，凸頭，唇瓣Y字形，中部兩側剪裂，裂片線狀絲形，前部深裂為二，裂片線形，距呈囊狀三角形。自生於全省山地林蔭，草叢中陰濕處。

藥用價值甚高

金線蓮用全草，鮮用或曬乾皆可，鮮用一斤約九百元，曬乾一兩市價約三百元。全

年可採收。

據說有清涼退火，涼血固肺，祛傷解鬱，開中氣，滋養強壯之效。可能治肺病、高血壓、蛇傷、腎虧、小兒發育不良。

用量十二~四十公克，因金線蓮是屬於蘭科，往往在藥材中混有金線蓮屬及斑葉蘭屬植物，購買者須謹慎分辨，若不明白可將鮮品送到台北市羅斯福路四段台灣省農業試驗所藥用植物研究室鑑定。

分根扦插繁殖

金線蓮喜在海拔一、五〇〇公尺以上二八〇〇公尺以下的陰濕山地生長，年平均溫度在攝氏十度~十五度最理想。

最高溫度不能超過攝氏二十五度，相對濕度約六〇~八〇%，土質為富含腐植質的黏壤土。

一般繁殖法以分根，扦插，及種子播種三種方法，其中因種子收穫不易，大都以分根，扦插法繁殖。

①分根繁殖：將母株掘起，帶有根的小株分割成數株再種，這種方法成活率高，為藥農所喜歡採用。

②扦插繁殖：剪取帶有節的枝條長約十公分，插植於疏鬆的沙壤土，待成活後再移植。

注意濕度及遮蔭，太濕容易腐爛，成活率約三〇~七〇%，分根及扦插繁殖在春末夏初較易成功，太早、太晚因溫度太冷容易凍死。

氮素葉面施肥


金線蓮的管理方法簡便，因其根大部分生長於表土二〇公分處，因此不必深耕，基肥以腐熟的有機質最好，不腐熟的請勿使用，以免根部腐爛。

視其發育情形酌施追肥，這肥以糞肥為主，用水沖淡，行葉面施肥更好。並行中耕除草，有夜盜蟲為害時，要注意防治，若能於網室中精密栽培，生長較快。

收穫加工調製

當金線蓮生長至二〇公分左右時，可剪取地上部莖葉洗淨，曬乾，密封於塑膠袋中，送到中藥行出售，地下根部待明年又會長出新芽。

目前價格很高，若能栽培成功，一定可以賺錢，是經濟價值非常高的藥用植物。



金線蓮 (薛連賢)