

嘉納蝸牛(左)吃非洲幼螺

殼紡錘形，右旋，具七層螺紋，淡紅褐色至紅褐色。肥行時可見其纖長之灰黑色肉體。頭

部在肉體前端，具有一對前觸角及後觸角。

口器位於頭前端下方，在前觸角後右邊有一個雌雄總生殖孔。

玫瑰蝸的活動也和非洲大蝸牛一樣，捕食、交配、產卵都是在夜間。

每年繁殖一代，有冬眠及休眠現象。卵橢圓形，長徑〇·五〇·六公分，白色。

玫瑰蝸喜歡捕食殼長在一·五~三公分的大蝸牛。捕食時先以頭部伸入大蝸牛壳口，而後緩緩嚙入，至食盡蝸肉留下空壳為止。遇到小型的大蝸牛，可以連壳吞食。

嘉納蝸牛 適應環境

嘉納蝸牛肉食性，原產東非洲，於一九六一年自夏威夷引進

。雌雄同體，蝸壳淡灰白色。壳形稍具圓形，有七層螺紋，圓徑一·八~二·〇公分，長徑二·六~二·八公分。

一般成蝸體形大小相仿。頭腹部橙黃色，腹側稍帶灰色，腹背與觸角為美麗之桔紅色。夜間活動，捕食能力比玫瑰蝸強。

在夏季高溫乾燥時亦有休眠狀態，冬眠則不顯著。整年中均可活動產卵。

這兩種克制非洲大蝸牛的天敵，在農試所飼育多年，確認能適應本省風土。在自然環境下生長情形較室內飼育更為適合，並能捕食多種有壳類害蝸。

在田間釋放時，雖能生長繁殖，但仍有逐年減少以至絕跡的傾向。

四年前釋放在嘉義田間的嘉納蝸，目前仍然自行繁殖，生長良好。可見選擇理想地區釋放，最為重要。


台灣窗螢(螢火虫)的幼虫，專食一~三公分的非洲蝸。可是生長環境只限於水溝、溪流岸邊的潮濕地帶

。捕蝸量也很低，所以防治害蝸的效果不大。

本省山林內，還有一種山龜，俗稱「蛇龜」，可以吞食壳長四公分以下整隻蝸牛。六公分以上者可咬死，取食部分蝸肉。

據室外飼育觀察，一夜間可以捕食非洲大蝸牛成蝸八隻。

其他如雞鴨等家禽、蟾蜍、青蛙、蟹類、烏鴉、麻雀、鴿子及馬蟻、步行虫等，能捕食蝸牛，有部分的克制作用。



非洲大蝸牛天敵玫瑰蝸牛

啓事：這是本刊連續刊載，關於蝸牛的第二篇特寫。上期「江重立：談蝸牛」討論大蝸牛的名稱，來源及性質。本期介紹大蝸牛的二種天敵。

近來本省各地，都有炒螺肉的小食攤。露螺是否可吃？請注意本刊下期報導。——編者

優良 **新** 選種

天理 交配

大和農園產品

(長岡交配各品種等現貨供應)

1973年

★ 寶力甘藍

經二年審鑑，最能受氣候考驗，最耐暑、抗病、不裂球、高溫濼雨不腐心、草勢旺，具60日甘藍之型態及優點，結球整齊、扁圓，四季皆宜。每球三台斤左右。本季五、六月採收成功，已掘起甘藍羣中之新彗星。

★ 三季蔞霸王白菜

本品種在台播種已風評全省，其品質具有獨特優點，耐寒暑、抗病、霪雨不腐爛、結球完全包被，食味俱佳，最宜內外銷，比任何品種更深花，不易抽苔，每球三公斤左右，保持十成收穫。

★ 巨豐菠菜 ミカサ菠菜

本品洋種，生長快，可在八月至三、四月間隨時播種，比其他品種產量高數倍。(高冷地區夏作佳種，原封包精美繪袋裝)

★ 金力甘藍

一代交配種，耐暑、抗病、抗旱等極強，最適合本省四季栽種，定植55~60日可收成，質甜嫩柔軟，每球重三台斤左右，在台多年歷史，為一致讚譽品種。

★ 小玉西瓜 ★ ニューメロン香瓜

★ 金城甜瓜 ★ 黃金九號甜瓜

原封新進口，產品最據信譽，永遠領先其他品種，甜度13度以上，市場最受歡迎，價高易售。

★ 502洋蔥子 ★ 711綠蘆筍子(美國太陽牌原裝新貨)

★ 各種草花種子、球根 精美繪袋包裝40餘種

台總代 灣理

新裕興企業股份有限公司
新合成種子行
台北市迪化街一段一四九號
台灣郵政劃撥：502號 TEL. 543787