


西洋白花菜

黎明敬



西洋白花菜 (洪祖仁)

西洋白花菜的生长期較一般矮生草本花卉為長，最少也需要四個月時間方能充分成長，以至盛放。

由於株型

大，高度多在三、四尺之間，株寬亦達二、三尺，發芽

後可先行假植，再行定植，以節省空間。

經過移植兩次的花苗，成長得較均衡而壯碩。如移入盆鉢中種植，要

用五寸以上的花盆，以免限制根羣伸張。西洋白花菜性喜疏鬆而肥沃的土質，尤以盆栽時更應注意培育土的調配。半量的堆肥或有機質，混合培養土最為理想。定植後一星期施肥基肥，生長期進入一個半月後再施肥一次追肥，即可正常發育。如培養的肥分不足或種植季節不宜，即使抽苔開花，花朵勢必疏落，因而失去原有的美觀。

西洋白花菜在本省採種容易。成熟的長條型蒴果中，有四列排得很整齊的密生種子，附着於果莢壁上。未裂開前收集風乾，封存於陰涼處，即可供下一季栽培。在歐美各國，如以草花種子生產和消耗統計上來比較

西洋白花菜 (*Cleome*) 的栽培，近年在本省日漸盛行。許多業餘種花人的庭院中，常出現它的踪跡。這種熱帶美洲及非洲原產的花卉，帶給人最深刻的印象是形狀優美，花朵奇妙。

挺立的花梗頂端，有無數叢生的花苞，花色因品種不同而有粉、白、紫、藍之別。

相同的四片小花瓣呈十字形排列，形狀似白菜花朵一般，因此叫做白花菜。花苞內有蜜腺，盛開時散放出濃郁的香氣。在月色中，花朵和多幾片的葉兒婆娑起舞，恰如一幅精心設計的活動圖案。

西洋白花菜通常都是以播種法來培養，播種期因地域的不同而有春秋之分。溫帶地區為了避免霜雪傷害，除溫室育苗外，多在春初播種。本省以秋季播種為宜。因夏季溫度過高易成徒長，開花不好，生長瘦弱。

西洋白花菜居於相當重要的地位。

在草本花卉中，西洋白花菜受人重視的

原因，在於下列幾種特色：低矮嬌弱的花叢

中，需要如此高挺的種類來構成對比。種植

西洋白花菜的生長期較一般矮生草本花卉為長，最少也需要四個月時間方能充分成長，以至盛放。

平面化的庭園中，需要有立體感的種類來加以調和。驚紅駭綠的花葉裡，更需有優雅芬芳的色澤和氣氛來拱托。

本省雲林、嘉義、台南、高雄等數處專業的花卉採種公司，年年都有試驗性栽培和種子生產。相信短期內將可由國內自行生產優良品系的種子，以應種植玩賞的需要。

珍品，色彩鮮豔，富變化。

鶯歌鳳梨光澤鮮綠，花穗扁平。花苞黃色，基部鮮紅色，非常美麗。

交配種中分枝較多的，很美觀。觀賞期可達一年之久。

迷你鶯歌鳳梨 (

鶯歌鳳梨

陳榮府

V. carinata)：原

產於巴西，形同鶯歌

鳳梨而型態較小。花

穗扁平，紅色至黃色

，非常明亮，像是用

蠟做成的模型。花葉

鮮麗，可保持六個月

這裡介紹的鶯歌鳳梨 (*V. poelmannii*)：看來很像塑膠製品，你要用手摸一摸

中用作裝飾盆景，最為相宜。種類繁多，達數千種以上，經常有名種出現。

這裏介紹的鶯歌

作品感覺驚異。

鶯歌鳳梨 (*V.*

poelmannii)：很

受人歡迎的品種，經

國熱家交配育出許多

以上。

其他品種以後陸續介紹。



鶯歌鳳梨 *V. Poelmannii*