


西洋白花菜

黎明敬



西洋白花菜 (洪祖仁)

西洋白花菜 (Cleome) 的栽培，近年在本省日漸盛行。許多業餘種花人的庭院中，常出現它的踪跡。這種熱帶美洲及非洲原產的花卉，帶給人最深刻的印象是形狀優美，花架奇妙。

挺立的花梗頂端，有無數衆生的花苞，花色因品種不同而有粉、白、紫、藍之別。相同的四片小花瓣呈十字形排列，形狀似白菜花架一般，因此叫做白菜花。花苞內有蜜腺，盛開時散放出濃郁的香氣。在月色中，花架和多裂片的葉兒婆娑起舞，恰如一幅精心設計的活動圖案。

西洋白花菜通常都是以播種法來培養，播種期因地域的不同而有春秋之分。溫帶地域爲了避免霜雪傷害，除溫室育苗外，多在春初播種。本省以秋季播種爲宜。因夏季溫度過高易成徒長，開花不好，生長衰弱。

用五寸以上的花盆，以免限制根羣伸張。

西洋白花菜性喜疏鬆而肥沃的土質，尤以盆栽時更應注意培育土的調配。半量的堆肥或有機質，混合培養土最爲理想。定植後一星期施基肥，生長期進入一個半月後再施一次追肥，即可正常發育。如培養的肥分不足或種植季節不宜，即使抽苔開花，花朵勢必疏落，因而失去原有的美觀。

西洋白花菜在本省採種容易。成熟的長條型蒴果中，有四列排得很整齊的密生種子，附着於果夾壁上。未裂開前收集風乾，封存於陰涼處，即可供下一季栽培。在歐美各國，如以草花種子生產和消耗統計上來比較，西洋白花菜居於相當重要的地位。

在草本花卉中，西洋白花菜受人重視的原因，在於下列幾種特色：低矮嬌弱的花叢中，需要如此高挺的種類來構成對比。種植

西洋白花菜的生長期較一般矮生草本花卉爲長，最少也需要四個月時間方能充分成長，以至盛放。

由於株型大，高度多在三、四尺之間，株寬亦達二、三尺，發芽後可先行假植，再行定植，以節省空間。經過移植兩次的花苗，成長得較均衡而壯碩。如移入盆鉢中種植，要

平面化的庭園中，需要有立體感的種類來加以調和。驚紅駭綠的花葉裡，更需有優雅芬芳的色澤和氣息來烘托。

本省雲林、嘉義、台南、高雄等數處專業的花卉採種公司，年年都有試驗性栽培和種子生產。相信短期內將可由國內自行生產優良品系的種子，以應種植玩賞的需要。

鶯歌鳳梨

陳榮府

觀賞鳳梨能夠適應室內環境，家庭中用作裝飾盆景，最爲相宜。種類繁多，達數千種以上，經常有名種出現。

這裡介紹的鶯歌

鳳梨 (Vriesea)，作品感覺驚異。鶯歌鳳梨 (V. poelmannii)：很看起來很像是塑膠製品，你要用手摸一摸，才會對於大自然的園藝家交配育出許多

珍品，色彩鮮艷，富有變化。

鶯歌鳳梨光澤鮮綠，花穗扁平。花苞黃色，基部鮮紅色，非常美麗。

交配種中分枝較多的，很美麗。觀賞期可達一年之久。

迷你鶯歌鳳梨 (V. carinata)：原產於巴西，形同鶯歌鳳梨而型態較小。花穗扁平，紅色至黃色，非常明亮，像是用蜡做成的模型。花葉鮮麗，可保持六個月以上。

其他品種以後陸續介紹。



鶯歌鳳梨 V. Poelmannii