

通草多野生

培？

(二) 現在市面上，那些機構專門收購通草？

(三) 通草有何用途？(高雄鳳山郵政七六四九附十五號信箱謄臨祥)

【答】：(一) 通草用種子繁殖，通常於十二月播種，翌春移植。行株距各為一·二公尺。

種植後第三年開始收穫，至第七年廢耕。每公頃收穫量約為九〇〇公斤。

高雄市張萍女士來信問：

乙女在五十三年和甲男結婚，並且生有一個孩子。三年後，兩人同意離婚。

○當時在報上刊登離婚啟事，但戶籍上並未辦理清楚。

夫妻兩願離婚須有法定手續

夫妻名義取消，手續要怎麼辦？辦好手續以後，孩子是不是仍歸乙女？

警察電台法律顧問張龍文律師答

覆：第一、依民法第一〇五〇條規定，兩願離婚，須以書面辦理，並且，應該有二人以上證人的簽名。不屬於這項規定的，不生離婚的效力。

來信只說在報上刊登離婚啟事，如果沒有另寫離婚書約，和經二人以上證明，仍不能發生離婚效力。

第二、經過合法的離婚手續，自然可以憑離婚証書，向戶籍機關申請辦理離婚登記。

第三、夫妻離婚，如果經過雙方同意，孩子

(一) 本省山地，如宜蘭大同鄉，臺東吳鳳鄉，屏東霧台鄉等處都有野生通草。

目前尚無栽培生產。一般由商人採收，售給各地藥材行。並無專收通草的機構。

(二) 通草除藥用，另一種用途為製造通草紙原料，但消費量似乎不大。(羅永春)

(三) 通草除藥用，另一種用途為製造通草紙原料，但消費量似平不大。(羅永春)

【答】：(一) 嘉德利亞蘭葉尖會分泌少許甜的汁液，螞蟻常去覓食。

(二) 螞蟻在蘭盆做窩，直接會影響根部呼吸作用。間接會引

介壳蟲為害。

作窩時應毀掉。平常每月撒布一·五〇〇倍的馬拉松，或五〇%「加保利」五〇〇倍稀釋液即可防治。(呂淑濤)

亞蘭幼芽的尖端？

(一) 螞蟻在蘭盆或蛇木做窩，會傷及蘭根嗎？要如何防治？(新竹新埔鎮亞東路一〇〇號朱大洪)

富農種苗信用可靠
自辦育種生產·直營出口進口
美國日本等各國優良種子到貨了！

交配	甘藍	交配	甘藍
長岡抱子甘藍	宇治一號甘藍	長岡抱子甘藍	宇治一號甘藍
耐病工力甘藍	伊ナミ秋甘藍	高冷地用豐富甘藍	高冷地用豐富甘藍
長岡60日甘藍	長岡四季種甘藍	長岡初秋甘藍	涼風60日甘藍
長岡60日甘藍	長岡60日甘藍	長岡60日甘藍	長岡60日甘藍

交配	白菜	交配	白菜
長岡理想白菜	宇治新種白菜	長岡理想白菜	宇治新種白菜
宇治脫普甘藍	伊ナミ秋各時甘藍	宇治甘藍	伊ナミ秋各時甘藍
高冷地用豐富甘藍	高冷地用豐富甘藍	高冷地用豐富甘藍	高冷地用豐富甘藍
長岡抱子甘藍	長岡抱子甘藍	長岡抱子甘藍	長岡抱子甘藍

配交	富農	配交	富農
40日早夏花椰菜	40日夏寶花椰菜	45天夏花椰菜	45天夏花椰菜
旭姪蕃茄	耐病新寶茄	夏姬蕃茄	宇治新種白菜
耐病新寶茄	旭姪蕃茄	耐病新寶茄	伊ナミ秋甘藍
高砂白菜	高砂白菜	高砂白菜	高冷地用豐富甘藍
坂田濱綠白菜	坂田濱綠白菜	坂田濱綠白菜	長岡抱子甘藍
長岡沙拉白菜	長岡沙拉白菜	長岡沙拉白菜	長岡抱子甘藍

類菜果配交	夏姬蕃茄	夏姬蕃茄	夏姬蕃茄
夏姬蕃茄	耐病新寶茄	耐病新寶茄	宇治新種白菜
耐病新寶茄	旭姪蕃茄	旭姪蕃茄	伊ナミ秋甘藍
高砂白菜	高砂白菜	高砂白菜	高冷地用豐富甘藍
坂田濱綠白菜	坂田濱綠白菜	坂田濱綠白菜	長岡抱子甘藍

配交	富農	配交	富農
40日夏寶花椰菜	40日夏寶花椰菜	45天夏花椰菜	45天夏花椰菜
耐病新寶茄	耐病新寶茄	夏姬蕃茄	宇治新種白菜
高砂白菜	高砂白菜	高砂白菜	伊ナミ秋甘藍
坂田濱綠白菜	坂田濱綠白菜	坂田濱綠白菜	高冷地用豐富甘藍

類菜果配交	夏姬蕃茄	夏姬蕃茄	夏姬蕃茄
夏姬蕃茄	耐病新寶茄	耐病新寶茄	宇治新種白菜
耐病新寶茄	旭姪蕃茄	旭姪蕃茄	伊ナミ秋甘藍
高砂白菜	高砂白菜	高砂白菜	高冷地用豐富甘藍
坂田濱綠白菜	坂田濱綠白菜	坂田濱綠白菜	長岡抱子甘藍

富農種苗貿易公司

高雄市林森一路一五〇號
電話：一二二四四九·二七四四八三

郵政劃撥高字第四〇七一四號