



# 硼酸防治馬蟻

馬蟻和蟻同是家庭中討厭的昆蟲，一直困擾着家庭主婦。

現在介紹一種簡單馬蟻防治劑的調製方法，據日本雜誌介紹，是蠻有效大家不妨試一試：

用水三，硼酸三，沙糖三，蜂蜜十的比例，並依上列的順序，依次放入小鍋中煮溶，煮到呈透明時，端起冷卻。

然後將這些藥液少量敷於紙板上，放在馬蟻巢穴附近，或放在馬蟻棲的地方，馬蟻將會把紙板上的藥液，搬入巢中，連續使用二三天後，巢中的馬蟻就可全部殺滅。

——黃添盛

# 母豬勿吃烟草莖

母豬取食烟草莖，雖然不會直接傷害母豬，但可能使生下來的小仔豬曲腿，沒法站立或哺乳，常常會在出生不久死去。

肯塔基大學獸醫學家瓦特·克勞博士，發現數千隻畸型仔豬，跟母豬取食烟草莖有關係，而且他也發現，畸型仔豬並沒有遺傳性。

克勞博士指出，母豬喜歡新鮮剝過皮的烟草莖。好多次他確實看到母豬在吃烟草莖。烟草莖的外層是不質，但內部却是多汁的髓。豬會碎莖，再吃中間的髓。

在肯塔基和米蘇里兩州，已經有發生畸型仔豬的報告。大多

事例指出：懷孕的母豬吃烟草莖，每窩仔豬約有一半是畸型的。

——常耕取自 Crops and Soils, Aug-sept.

# 大熊貓

大熊貓是我國珍貴動物之一，動物學者曾在全國各地，發現過牠的化石，因此斷定過去必在我國生棲，分布很廣。但是目前只有生棲在四川盆地周圍的高山、野生竹林中。


據觀察，牠不但愛吃竹筍，也吃小鳥、蛇、竹鼠等，尤其更愛吃燒肉。和黑熊一樣，有雜食的習性，但無冬眠的習慣。

由大熊貓的化石發現，牠與現在的大熊貓的骨骼很像，大熊貓的耳、目、齒、四肢等器官的發育比熊要遲。

大熊貓並且還保持很多古代動物的特徵，因此變為科學研究重要的資料。

據

說，母大熊貓很會保護幼熊，生後三年，才准牠獨立行動。山狗是牠的大敵。



庭樹的大熊貓

去我們都稱牠為大熊貓；不過牠很像貓的熊，應該叫大貓熊。

請參閱本刊第二十二卷二十三期「我國高原珍獸熊貓」一文。

——吳學章取材自「鳥獸月刊」

# 柑桔籬式栽培

不需要用梯子，也不要爬上果樹，很方便就可採收的柑桔「籬笆式」栽培，最近由日本德島縣果樹試驗所，試驗成功。

這種新式整枝法，是在柑桔園內，每距離二公尺插上一支二公尺長的鐵管，鐵管與鐵管之間張布鐵絲網，把柑桔的莖枝誘引入網，使樹形像籬笆一樣，造成一道牆。

「籬笆式」栽培的優點有：

- ①耕作道寬闊，可使農機自由出入。
- ②節省採收勞力。
- ③可提高單位面積產量與柑桔的精度。

——鳳晨取材自「家之光」

富農種苗信用可靠  
自辦育種生產·直營出口進口  
美國日本等各國優良種子現貨供應

**配交藍甘**  
宇治一號甘藍 長岡一號甘藍  
イナミ初夏一號 (はやどり) 甘藍  
宇治脫普甘藍 長岡早秋甘藍  
イナミ秋冬時 (多どり) 甘藍 涼風60日甘藍  
長岡四季種甘藍 高冷地用豐實甘藍  
長岡初秋甘藍 初夏エース甘藍  
天理金力甘藍 長岡60日甘藍  
耐病エース甘藍 長岡抱子甘藍

**配交白**  
長岡理想白菜 宇治新はやぶさ白菜  
強心理想白菜 長岡二號白菜  
宇治理想白菜 高砂白菜  
長岡耐病60日白菜 宇治大型春時白菜  
白妙白菜 長岡金將白菜  
坂田濱綠白菜 霸王白菜  
長岡サラダ白菜 坂田濱光白菜  
アサヒ45日白菜

**配交農富**  
40日早夏花椰菜 45天春夏花椰菜  
40日夏實花椰菜 美國交配極早青花菜苔  
綠峯極早青花菜苔

**配交果菜類**  
夏姬蕃茄 強力みのり蕃茄 綠光大甜椒  
旭姬蕃茄 耐病新寶冠蕃茄  
富實新一、二號西茄 桃山蕃茄  
耐病新夏冠蕃茄 香蘭(サンライズ)香瓜  
實冠蕃茄 豐麗青殼四號蕃茄 新芳露香瓜  
夏冠蕃茄 愛知桃形鮮紅蕃茄 白鳥香瓜  
松風胡瓜 春型東緣胡瓜 長緣胡瓜

日本最優良人蔘，尾張鮮紅五寸人蔘，夏鮮鮮紅五寸人蔘其他美國嫩莖高苜、各種結球高苜、胡蘿蔔、紅高麗菜、洋蒜、洋蔥、櫻桃蘿蔔、草花種子、三葉草、燕麥種子，應有盡有『價目表函索即寄』

# 富農種苗行

富農種苗貿易公司  
高崎市林森一路一五〇號  
電話：二二四四九・二七四四八三  
郵政劃撥高字第四〇七一四號