

硼酸防治馬蟻

馬蟻和蟻同是家庭中討厭的昆蟲，一直困擾着家庭主婦。

現在介紹一種簡單馬蟻防治劑的調製方法，據日本雜誌介紹，是蠻有效大家不妨試一試：

用水三，硼酸三，沙糖三，蜂蜜十的比例，並依上列的順序，依次放入小鍋中煮溶，煮到呈透明時，端起冷卻。

然後將這些藥液少量敷於紙板上，放在馬蟻巢穴附近，或放在馬蟻棲的地方，馬蟻將會把紙板上的藥液，搬入巢中，連續使用二三天後，巢中的馬蟻就可全部殺滅。

——黃添盛

母豬勿吃烟草莖

母豬取食烟草莖，雖然不會直接傷害母豬，但可能使生下來的小仔豬曲腿，沒法站立或哺乳，常常會在出生不久死去。

肯塔基大學獸醫學家瓦特·克勞博士，發現數千隻畸型仔豬，跟母豬取食烟草莖有關係，而且他也發現，畸型仔豬並沒有遺傳性。

克勞博士指出，母豬喜歡新鮮剝過皮的烟草莖。好多次他確實看到母豬在吃烟草莖。烟草莖的外層是不質，但內部却是多汁的髓。豬會碎莖，再吃中間的髓。

在肯塔基和米蘇里兩州，已經有發生畸型仔豬的報告。大多

事例指出：懷孕的母豬吃烟草莖，每窩仔豬約有一半是畸型的。

——常耕取自 Crops and Soils, Aug-sept.

大熊貓

大熊貓是我國珍貴動物之一，動物學者曾在全國各地，發現過牠的化石，因此斷定過去必在我國生棲，分布很廣。但是目前只有生棲在四川盆地周圍的高山、野生竹林中。

據觀察，牠不但愛吃竹筍，也吃小鳥、蛇、竹鼠等，尤其更愛吃燒肉。和黑熊一樣，有雜食的習性，但無冬眠的習慣。

由大熊貓的化石發現，牠與現在的大熊貓的骨骼很像，大熊貓的耳、目、齒、四肢等器官的發育比熊要遲。

大熊貓並且還保持很多古代動物的特徵，因此變為科學研究重要的資料。

據

說，母大熊貓很會保護幼熊，生後三年，才准牠獨立行動。山狗是牠的大敵。

去我們都稱牠為大熊貓；不過牠很像貓的熊，應該叫大貓熊。請參閱本刊第二十二卷二十三期「我國高原珍獸熊貓」一文。

——吳學章取材自「鳥獸月刊」

柑桔籬式栽培


不需要用梯子，也不要爬上果樹，很方便就可採收的柑桔「籬笆式」栽培，最近由日本德島縣果樹試驗所，試驗成功。

這種新式整枝法，是在柑桔園內，每距離二公尺插上一支二公尺長的鐵管，鐵管與鐵管之間張布鐵絲網，把柑桔的莖枝誘引入網，使樹形像籬笆一樣，造成一道牆。

「籬笆式」栽培的優點有：

- ①耕作道寬闊，可使農機自由出入。
- ②節省採收勞力。
- ③可提高單位面積產量與柑桔的精度。

——鳳晨取材自「家之光」



庭樹的大熊貓

富農種苗信用可靠
自辦育種生產·直營出口進口
美國日本等各國優良種子現貨供應

配交甘藍
宇治一號甘藍 長岡一號甘藍
イナミ初夏一號 (はやどり) 甘藍
宇治脫普甘藍 長岡早秋甘藍
イナミ秋冬時 (多どり) 甘藍 涼風60日甘藍
長岡四季種甘藍 高冷地用豐實甘藍
長岡初秋甘藍 初夏エース甘藍
天理金力甘藍 長岡60日甘藍
耐病エース甘藍 長岡抱子甘藍

配交白菜
長岡理想白菜 宇治新はやぶさ白菜
強心理想白菜 長岡二號白菜
宇治理想白菜 高砂白菜
長岡耐病60日白菜 宇治大型春時白菜
白妙白菜 長岡金將白菜
坂田濱綠白菜 霸王白菜
長岡サラダ白菜 坂田濱光白菜
アサヒ45日白菜

配交農富
40日早夏花椰菜 45天春夏花椰菜
40日夏實花椰菜 美國交配極早青花菜苔
綠峯極早青花菜苔

配交果菜類
夏姬蕃茄 強力みの蕃茄 綠光大甜椒
旭姬蕃茄 耐病新寶冠蕃茄
富實新一、二號西茄 桃山蕃茄
耐病新夏冠蕃茄 香蘭(サンライズ)香瓜
實冠蕃茄 豐麗青殼四號蕃茄 新芳露香瓜
夏冠蕃茄 愛知桃形鮮紅蕃茄 白鳥香瓜
松風胡瓜 春型東緣胡瓜 長緣胡瓜

日本最優良人蔘，尾張鮮紅五寸人蔘，夏鮮鮮紅五寸人蔘其他美國嫩莖高苜、各種結球高苜、胡蘿蔔、紅高麗菜、洋蒜、洋蔥、櫻桃蘿蔔、草花種子、三葉草、燕麥種子，應有盡有『價目表函索即寄』

富農種苗行

富農種苗貿易公司

高崎市林森一路一五〇號
電話：二二四四九・二七四四八三
郵政劃撥高字第四〇七一四號