




美國首都華盛頓公園中的鬱金香（林果）

鬱金香

陳文孝

鬱金香 (Tulip チューリップ) 原產中亞，秋天栽植，經過冬天的低溫刺激到春天發育開花，是高尚的球根花卉。


本省平地夏季炎熱多雨，鬱金香莖葉早枯，根部失去活力，以致花期短暫，球根無法收穫。如能利用高冷地，選擇適宜本省栽植品種，頗有經濟價值。

荷蘭為鬱金香品種的分布中心。依據荷蘭球根協會，鬱金香品種命名登錄委員會的統計，現有品種約三、三〇〇種，幾乎全部在荷蘭育成。適合本省栽培的品種有：Late Double (Triumph Double), Darwin Hybrids, Cottage (Single Late) 等，特別適宜盆栽，花姿鮮麗，頗有發展前途，這是我實際調查的結果。

鬱金香球根的栽植適溫，是在地溫二三度C左右。本省北部或中部高冷地，十一月十日到十一月二十日之間溫度逐漸降低，適合球根種植。

翌春四、五月間開花，花後莖葉枯萎，五月中、六月上旬收穫種球。

這個時期，本省氣溫較高，常使花芽分化提早，球根的营养分消耗太甚，形成不良種球。



鬱金香球根着生狀態

最好的辦法是將收穫的球根，經過乾燥處理，然後貯藏在二〇度C倉庫裡。

等到花器完成後，移入一五度C的貯藏庫內。五、七日之後，再移入二、三度C貯藏庫內。經過五、十五日左右，可使球根發育良好，成為優良種球。

鬱金香喜歡微酸性砂質壤土。粘重土因偏向酸性，不適合生長。

本省降雨量較豐，可行高畦栽培，必要時行畦間灌溉。沙質土地可做平畦，減少水分流失。

球根的栽植密度依球的大小而定，一般是每三三平方公尺二五〇球。密度如太大，球根生產率降低。如太疏，又浪費土地。鬱金香的生育適溫在一七、二〇度C之間。超過生育適溫範圍時，根的活力喪失，莖葉老化枯萎，養分漸向球根移動。

這時，球根的外皮漸漸變成褐色。當褐色部分占整個球根約七〇%時，為最適宜的收穫期。

過早收穫，球根連帶的根及莖不易去，發育不好。

太晚收穫時，球散落各處，不易找尋。