

農業信箱



農藥時效

〔問〕：(一)已調好的石灰硫磺合劑，儲存在桶內，可儲存多久？現已儲存一年，藥效如何？

(二)果樹施石灰硫磺合劑，最少應隔多少時間施藥一次？是否可與硼沙混合使用？

(三)夏季可否用石灰硫磺合劑？

(四)波爾多液在夏季是否可以使用？會不會對果樹引起藥害？應該用幾斗式？(桃、蘋果、梨)

(五)波爾多液與石灰硫磺合劑在冬季落葉後的使用，在時間上應該怎樣調節？

(六)調配波爾多時，水溫應該怎樣才能調配得最適當？(花蓮秀林鄉富世村大禹嶺關原十號于寶榜)

〔答〕：(一)石灰硫磺合劑不論自製或原裝成品，應於製好或開出即日使用，以免減低藥效。

此合劑與空氣接觸後，會減低藥效。減低程度看儲存情形及受氧化分解程度而異，但不至於完全失效。

(二)常綠果樹施石灰硫磺合劑時，以每月一次為宜。落葉果樹，則施藥次數可稍增加。

混合硼沙，少量應無問題，但量過多會發生沉澱，可先作小試驗。

(三)高溫強日照時，施用石灰硫磺合劑，藥害會增大，最好避免。

(四)波爾多液在夏季可用，但應減少次數以免藥害。對桃等較易起藥害，應採用過石灰波爾多式或八斗式。

(五)波爾多液與石灰硫磺合劑最好是每月間隔使用(第一月用波爾多液，第二月用石灰硫磺合劑)。

(六)溶化硫酸銅時，用熱水較快溶化。生石灰須用冷水慢慢化開。調合時，在常溫下即可。(洪維懷)

雞眼虫

〔問〕：雞的眼睛流淚不敢開，有眼晴，眼部腫脹的現象，後來慢慢的死亡。感染此病的雞是中雞至大雞較多，這不是『雞眼虫』？如何防治？(高雄內門鄉木柵村木柵六〇號翁土城)

〔答〕：據你所說雞的病狀，很可能是患雞眼虫。


雞眼虫治療方法：用局部麻醉劑(丁丁Butyn)滴數滴於雞眼中，然後將膜拉開，並滴一二滴克里奧林(Crocin)，同時必須即行灌沖清潔水，以免刺激太大。

經此處理後，眼虫即可殺死，而將虫取出。雞眼虫除去後，雞眼就漸復原。

為避免雞眼虫的感染，要保持雞場所的清潔。木枝碎片應清除，以防蟬蟬躲藏，因蟬蟬就是雞眼虫傳染的媒介。(李登元)

F1大紅雜交西瓜種子


※本品種與紅娘西瓜子相比美
※目前最有人氣之大紅西瓜



※發芽力特強，草勢強盛，早生抗病性極強，果皮薄而硬，子粒少而甜度極高，果肉深(大)紅，果形球橢圓，果色淡綠網紋美觀，果重約十二公斤以上，結果力極強，留果後80天採收。

新小鳳——一代交配

※本公司鄭重推出之新品種
※適於各種土壤栽培西瓜



※生長力比小鳳強健，比小鳳約早熟一星期左右，結實力強，清甜易食，肉質比小鳳嫩，清甜爽，果實高球形狀，果肉深黃色，果重約二公斤以上，種子細小，產量豐多，風味高雅。

◎各種西瓜子、西瓜嫁接匏瓜苗現貨供應，歡迎訂購。

農偉種苗實業公司 地址：高雄市民族二路281號 電話：285193

水盛種子行 門市部：地址：鳳山市第一市場25號 電話：462615 郵局劃撥：鳳山郵局41723

小鳳一代交配

※極早生，生育強健播種後65天可採收，每株可結6~12果，糖分約12~13度左右，果重約1公斤上下，皮面條紋明美，果肉深黃色，適於各種土壤播種。

無子西瓜鳳山一號

※目前最有人氣之果實，果形圓球形狀，果皮青黑色，果肉紅色，糖分約12度左右，品質優良，果重6~10公斤，每株可產3~4果，抗病力強，結果力亦強。

◎西瓜連作地之救星：西瓜嫁接匏瓜苗大產供應

①最耐霜寒而抵抗力，土壤害菌，如蔓刺病，毒素病及立枯病等之最佳改良西瓜嫁接苗。②任何不良地質均能適應。③產量最高，比無嫁接之西瓜約增產百分之五十左右。④生長力特強，而病害少。⑤甜度比一般無嫁接之西瓜約高出二~四度。