

大家一齊來防治老鼠！

洪汝煌

老鼠活動為害範圍廣，繁殖力驚人，以野鼠而言，幼鼠出生後一個月左右可再生育，一對老鼠一年約可生產八八〇隻。

過去本省農民防治老鼠，常自行向市面購買「弗拉多」（俗稱紅藥水）的鼠藥，混和糙米使用，或利用鼠籠捕殺。但由於個別辦理，且由於「弗拉多」是一種劇毒藥劑，老鼠取食後痛苦，死狀可怕，引起其他鼠羣的恐慌而發生忌食，防治效果並不理想。

全面加強放毒滅鼠

由於老鼠繁殖力驚人，活動範圍又廣，所以防治工作必須是全面的。同一地方的農民及一般住戶，大家都應在同一時間一齊辦理。而且所用的老鼠藥必須毒性溫和，可避免其他鼠隻發生忌食，繼續取食，達到理想的防治效果。

政府為協助農友及一般民衆全面防治老鼠，除於民國四十六年，曾經發動一次全省野鼠防治工作外，並自五十九年再度訂定六年的防治計畫，將全省分為南、中、北三區，分區分年實施防治，每區繼續防治四年。南區包括雲林縣以南及台東縣的八縣市，目前已實施三年。

中區即台中、彰化、南投、花蓮等五縣市，也已實施兩年。

北區即苗栗縣以北的六縣市，從六一年開始實施，三年來，各區實施結果，成績相當良好。第一年僅於南區檢收鼠尾達五五六萬條，第二年包括南區及中區，計檢收鼠尾達四七〇萬條，至第三年，包括全省各縣市，經抽樣測定防治效果，平均殺鼠率達七九%。（按第三年因各方反應收集鼠尾不衛生，改用效果測定）。

六二年鼠害防治工作，防治區域仍包括全省各縣市，現已在積極辦理防治準備，自十一月間開始，至六十三年四月間，依據各縣市實際情形，各選定一個期間，全面發動

放毒滅鼠工作，請各地農友隨時注意鄉鎮公所、農會或衛生所宣傳及通知配合辦理。茲將今年度採用老鼠藥劑（毒餌），藥劑特性，使用方法以及應注意事項，介紹於下：

毒餌採用殺鼠靈

藥劑特性：本年度鼠害全面防治，仍然採用「殺鼠靈」粉所製成的毒餌，其中家鼠是採用顆粒狀毒餌或餅狀毒餌或粒狀毒餌。野鼠是採用餅狀毒餌或粒狀毒餌。

「殺鼠靈」是一種無味無臭的藥劑，藥性溫和，老鼠中毒後無任何痛苦，而在安靜中死去，不致引起其他老鼠的驚擾和忌食。大家依照規定方法使用也很安全，是目前防治老鼠最好的藥劑。

放毒位置要適當

(1) 毒餌：粒狀毒餌是使用「殺鼠靈」藥粉和糙米、花生油（另加少許糖、塩）等調製，並以塑膠袋包裝（每袋一〇〇公克），以村里為單位統一製發。

餅狀毒餌是使用「殺鼠靈」藥粉和糙米、膠合劑等由工廠製造供應。

玉米、花生粉、粘膠粉等由工廠製成供應。

(2) 放毒方法：粒狀毒餌以盛餌器（碟皿等）盛放，又毒餌餅（餅狀毒餌）也可直接使用。

上述毒餌依規定選用一種，放置在鼠隻經常出沒而隱蔽的地方，每天檢查毒餌並補充消耗量，連續放毒二星期以上，直至鼠絕為止。這些毒餌放餉後因為慢性毒，須俟三天（五天）才可見效。毒餌必須足夠，才可避免變成餓肥老鼠。

毒餌使用是隨鼠隻的多少而加以增減，目前政府分配標準是這樣的：

① 野鼠：每公頃至少使用粒狀毒餌八〇

〇公克或毒餌餅十五片（可放八處以上）。
② 家鼠：每戶至少使用顆粒狀毒餌或粒狀毒餌三〇〇公克或毒餌餅十五片，放餉處數視實際需要而定。

清潔環境斷絕鼠源

毒死鼠隻，應即深埋土中至少三十公分以上，或放入垃圾桶，交給清潔隊處理，切勿亂丟，以維護公共衛生。對於家鼠防治，除使用毒餌實施毒殺外，並應經常注意辦理下列事項。

① 斷絕鼠糧：嚴密收藏食物，處理廚房食屑，不讓老鼠有吃的東西。

② 整理環境：清除不必要的雜物破爛，整理庭院，不讓老鼠有住的地方。

③ 防鼠設備：整修房屋，封閉鼠穴，鼠道不讓老鼠有來往的路線。



老鼠取食毒餌（林坤德）