



# 甘薯集團栽培效果好

陳益裕

台南縣佳里鎮，去年在子良莊舉辦過甘薯集團栽培示範，成效非常好。今年農友們自動要求再參加，而且已經組織「甘薯研究班」。

最近一次集會裡，大家在談論這方面的問題時，發言十分熱烈。特摘錄如下，供作參考。

**林樹華：**參加甘薯集團栽培，台南區農業改良場及農會推廣人員，給予各項技術指導，非常熱忱。而且省農林廳種苗繁殖場，有牽引機來協助整地作畦工作。對於深耕、刈耙、破碎土壤的功能很好，又省時省錢，給大家許多的方便。

**林榮欽：**大家過去作畦，都做得過寬，土地利用不經濟，甘薯產量不能達到理想。集團栽培要求畦距八〇至九〇公分，株距二〇至二十五公分，

每公頃能栽植五萬株左右，試驗結果，果然豐收了。

**丁春貴：**集團栽培鼓勵大家採用先端苗。因為先端苗生長勢強，發根發芽容易，塊根產量自然好。以往大家都不注意這點，使用組織已硬化，生理機能遲緩的基部苗，實在不對。

**蘇振益：**甘薯打植工具，如用鋤頭，那麼苗向斜傾方向插入畦中，雖然成活容易，操作便利，但將來薯形大小不齊，收量不高。還是用手，慢慢行水平淺插法，並將苗的基部一節曲斜，試驗結果，塊根着生整齊而大。

**林英雄：**集團栽培要大家栽植同一品種，我們過去都種台農新31號。聽說台南區農業改良場育成「台南15號」新品種，塊根產量及製粉率都31號高，品質也好，且不易腐爛。

尤適合台南地區內，二期水稻栽培後作甘薯種植的輪作田。農會應該設法鼓勵農友們經營採苗圃，提供大家種植機會。

**郭松茂：**我們往往誤以為「氮肥」影響甘薯生長最大，其實，農會推廣人員指出：氮肥對於甘薯葉蔓（即前半期）的發育確有關係，但是增加薯塊的產量，鉀肥施用最為要緊。因為據過去的試驗，每施氯化鉀一公斤，可使甘薯增收二五公斤，品質也同時提高。

**林春成：**目前肥料缺乏的現象，仍未消除。我們參加甘薯集團栽培區，如果因肥料缺乏，那麼其它方面的努力，便會受到影響。

所以可以請農會向上級反應，對今年集團栽培區，應該作足量的配給，以便施用。

**丁慶昌：**台南區農改場雜糧股李先生說：甘薯雖然是旱作，不過對水分的的需求仍然迫切，特別在生育後半期，塊根正開始肥大，重量開始增加。

我們這個地區天氣極為乾燥，根部吸收水分不足，生理機能遭受抑制。同化養分的儲藏量少，薯形自然不能肥大，總收量也隨著減少，所以適度灌溉，十分必要。

**陳財教：**去年參加集團栽培，技術指導人員要求說：如果天旱無雨，甘薯種植後四十、六十、八十天都須灌溉一次。事實上有些人還沒有設置抽水（地下）水設備，所以進行有困難。假如水利當局能夠配合需要，放水灌溉，影響甘薯增產，的確很大。

**林勝利：**今年集團栽培，聽說收穫時還要舉辦觀摩會，去年到場的人，不夠踴躍。因此，農會應該購備一些紀念品，贈送參加者，以提高觀摩興趣，及擴大宣傳。

**林美洲：**甘薯集團栽培，這種大面積生產技術綜合栽培，成果真得好。為了擴大推行，有關單位應該把這種成果、技術講解等過程，攝成影片。巡迴各地村莊放映，促使一般農友，盡量學習，以達到全面推廣增產的宣傳效果。

富農種苗信用可靠  
自辦育種生產·直營出口進口  
美國日本等各國優良種子現貨供應

**藍甘配交**  
宇治一號甘藍 長岡一號甘藍  
イナミ初夏一號 (はやどり) 甘藍  
宇治脫普甘藍 長岡早秋甘藍  
イナミ秋冬甘藍 (冬どり) 甘藍  
長岡四季甘藍 高冷地用豐高甘藍  
長岡初秋甘藍 初夏エース甘藍  
天理金力甘藍 長岡60日甘藍  
耐病エース甘藍 長岡初日甘藍

**菜白配交**  
長岡理想白菜 宇治新はやぶさ白菜  
宇治理想白菜 長岡二號白菜  
高砂白菜  
長岡耐病60日白菜 宇治大型春時白菜  
坂田濱光白菜 長岡金將白菜  
坂田濱光白菜 鷲王白菜  
アサヒ45日白菜 坂田濱光白菜

**配交農富**  
40日早夏花椰菜 45天春夏花椰菜  
40日夏實花椰菜 美國交配極早青花菜  
綠峯極早青花菜

**類菜果配交**  
夏姬蕃茄 強力みのり蕃茄 綠光大甜椒  
旭姬蕃茄 耐病新實冠蕃茄 桃山蕃茄  
富實新一、二號西瓜 香蘭(サンライズ) 香瓜  
耐病新夏冠蕃茄 豐麗青殼四號蕃茄 新芳露香瓜  
夏冠蕃茄 愛知桃形鮮紅蕃茄 白鳥香瓜  
松風胡瓜 春型東線胡瓜 長線胡瓜

日本最優良人蔘，尾張鮮紅五寸人蔘，夏播鮮紅五寸人蔘其他美國歐亞萬苣、各種結球萬苣、胡蘿蔔、紅高麗菜、洋蒜、洋葱、櫻桃蘿蔔、草花種子、三葉草、燕麥種子，應有盡有「價目表函索即寄」

## 富農種苗貿易公司

高雄市林森一路一五〇號  
電話：二二四四九・二七四四八三  
郵政劃撥高字第四〇七一四號