

一般母牛肥育 肉質中等以上

是利用繁殖性能低劣經淘汰的母牛，或經配種未能受孕的母牛，以及患有繁殖障礙的母牛（如子宮內膜炎、膈炎、不孕症），均可當作肥育之用。這種母牛未肥育之前，體重都在四五〇至四八〇公斤，年齡都在六至八歲齡，需經一〇〇至一五〇天的肥育，體重達到四八〇至五二五公斤時即可出售，屠宰後的肉質中等以上。

採用這種方式肥育飼養，一個人可管理五至一〇頭牛，一年之內可分為二至三批肥育後出售，資金周轉快，純益較多。

但有一點要注意的，就是有的牛羣中，經飼育半個月或一個月後，會發現食慾較差的牛，以致影響肥育效果者，須趕快售出以供市場屠宰，以免消耗飼料，並可節省飼養成本。

一般公牛肥育

充分供餵草料

是經繁殖後的肉用公牛配種能力不高，而遭淘汰的公牛或乳用公牛繁殖能力低劣者，經去勢後均可當作普通公牛肥育。

未肥育前體重四五〇公斤的牛，經肥育六至七個月時，體重可達五〇〇至六〇〇公斤。一般公牛肥育在夏秋牧草盛產時期，有足夠粗料供應，迅速飼肥後出售，可得較多利益。如在初春或冬天時期，牧草生長緩慢，應準備青儲草或乾草，充分供餵肥育。

老廢牛肥育

飼料應細切

顧名思義，就是利用繁殖後的老牛，或角輪老化的牛，以及繁殖性能不良的年輕母牛而遭淘汰者，也有利用經六產以後，繁殖力不高的母牛，都當作老廢牛肥育。

老廢牛的肥育年齡，都在八歲齡以上，肥育時應從恢復營養方面着手，使達到肥滿的體態。經一〇〇天的肥育後，生體重達到四〇〇至五〇〇公斤時，就可出售。屠宰的肉質是屬於中肉程度。

肥育的飼養管理，要適合各年齡牛的需要，飼養時間應在短期內使能上市，較為合算。

給與飼料應以含有脂肪性高的飼料為宜，太粗或過硬的飼料，需除去外皮外殼後，加以浸漬蒸熟，太長的根莖飼料，應細切處理，才可餵用。

因老廢牛大部分牙齒磨損，以致食下的飼料，咀嚼不全，消化緩慢，若能配合粉狀飼料飼餵，可在最短期間內完成肥育效果。

二歲左右女牛

是理想母牛肥育

理想的母牛肥育，是用二歲左右齡女牛，未供繁殖且發育尚未成熟的母牛，專供肥育之用。這種方式的肥育飼養，最短期間為半年，最長肥育也在一年以內。採用理想的肥育，均應在肥育與成長的雙重條件下完成。

肥育初期應酌量增加碳水化合物，如根塊類粗料或含澱粉質的飼料，使營養比例，成為適比，使體軀充分發育。

中期應酌量減少碳水化合物飼料，多給蛋白質豐富的飼料，如品質良好的青色牧草或在粗料內加些尿素二至三%，以增加蛋白質營養的吸收，這時的營養比，應為狹比，才符合肥育需要。

後期是肥育完成期，這時改給充分的谷物，或含脂肪較多的精料飼養，以增加肥度。



頑童騎牛角，太危險了！（陳兩祥）

● 母豬生產護理 ●

(一) 母豬生前體溫應與平常一樣，稍高一些一段時間而健康並無異狀，生產亦正常者，不需擔心。

但生後如有細菌感染患產褥熱時，體溫即升高，食欲減退，應立刻請有經驗的獸醫人員醫治。

生前母豬喘息呼吸快速情形，是由生產前陣痛引起的苦悶所致，不必擔心。

(二) 生後五天陰部尚流有乳白色污物，如不是太多，是正常的，如量多而有惡臭者，即子宮感染細菌發炎。

子宮內膜炎，應作子宮洗滌及注射抗生素及磺胺藥品等，也應請獸醫人員治療。

(三) 仔豬生後三天有茶色下痢，即是所謂仔豬白痢病。

應注意豬舍乾燥，母豬飼養管理。發生時，用磺胺藥品或抗生素治療。（林本欽）