



## 肉猪疾病的預防管理

趙法清

肉猪疾病的預防管理：

(1) 購買

肥育仔猪，必須注意來源及環境，賣方必須提供免疫及健康證明，不同來源的仔猪禁止混在一起飼養。

(2) 購進的肥育仔猪，應放在清潔、消毒的猪舍。應與其他猪羣隔離至少四星期，檢查其健康狀況。

(3) 禁止購入的肥育仔猪與種猪接觸。

(4) 新進的仔猪最初三天(五天，宜給與蛋白質含量較低的飼料(約一三·五—一四%)，或酌予減少飼量增加青料，飼料中也可添加抗生素。

管理人員在進場二周間應多加觀察，以早期發現疾病，加以控制，使能適應新環境、新飼料。

(5) 從斷乳至出售，仔猪應按體重分欄，不要按年齡而分，使在限定的設備內大小均勻，但應知其年齡與其生長增重情形，以便決定出售或淘汰適期。

同欄頭數的多少，與患病機會成正比，頭數愈多，危險性增大。

(6) 發現病猪立即隔離治療。

(7) 注意飼料的品質和平衡。

(8) 供應充足的清潔飲水。

(9) 注意防熱設備如噴洗及水浴，可促進增重及健康。

(10) 控制內寄生虫尤其是蛔虫、鞭虫，注意衛生設備，牧場輪流放牧及用藥劑防治。

猪舍地面、飼槽、運動場及青料應保持清潔。

如解剖或糞便檢查發現成虫卵，應隨即驅除，通常於日齡八〇—一〇〇天時施行。

寄生率高時應及早驅虫，以後每隔二個月驅虫一次。

(11) 經常驅除外寄生虫如猪虱及疥癬，不要等到嚴重時再驅除。

衛生方面的管理：

(1) 猪舍建築設計，應順着自然排水環境，以便迅速有效清掃。

(2) 猪舍地面每周至少清掃兩次，最好是每天清掃。

(3) 經常處理糞尿及污物。

(4) 猪出售後及附屬設備必須徹底清潔消毒，切實做到全進全出制度(All in and All out)。

(5) 防除蚊蠅鼠類等疾病的媒介。

(6) 屍體須深埋六尺深，並灑上生石灰掩埋泥土，或完全燒毀。

(7) 污物及褥草，必須深埋或燒掉。

(8) 猪舍設備，經常使用的消毒劑有熱鹼水溶液、石鹼、皂化煤油酚液等。

高單位，長效性，有機微量元素

# 葉綠素

長效性，肥料精要素

1. 肥分持久、改良土壤
2. 吸收迅速、連耕良好
3. 增進母穢發育
4. 防止母穢老化，幼穢未老先衰
5. 強根壯穢、效果持久
6. 促進肥大亦可提早成碩
7. 幼苗請混合清水5,000~10,000.00倍灌溉頭部

得力興業化學有限公司

豐原電話：2867號 郵政66號  
台北電話：516772·517570