

農業信箱



荔枝開花管理

〔問〕：(一)我種的荔枝在今年六月三十日(六月二十日採收果實完畢)及八月三十日各抽一次新芽，都較附近果園早(約早十五天)。八月底抽的新芽明春開花前會再抽芽而不開花嗎？是否需剝皮促使冬眠，以防再抽芽而明年不開花？

〔答〕：荔枝的冬眠期須多長，才會開花？(台中太平鄉光隆村永青園趙梓鏞)

〔問〕：(一)肉仔牛何處有售？價格多少？
(二)從事肉牛飼養，應先準備那些工作和條件？
(三)有關牧草青儲法如何？應有什麼設備？

〔答〕：(一)青皮豆可青儲嗎？
(二)大豆渣能充飼料用嗎？(台中中興鎮郵政七五六四附八號)

〔答〕：(一)本省目前還沒有肉仔牛固定的市場。通常買賣都是商人向農家零置洽購。

至於仔牛的價格，無一定標準的市價，高低情形完全依供求而定。目前一、二個月齡的仔牛價格大約新台幣二千元。

恒春畜產試驗分所常有仔牛推廣，如有需要可洽詢。

(二)從事肉牛飼養，首先應有牧草豐富的牧地及簡單的牛舍。

(三)青儲的設備，最簡單的是青儲窖，其他如青儲塔，牆形青儲溝等等都是。

製法是以三分一乾的青草或其他牧草切短，壓緊埋藏、密封備用。

(四)青皮豆的莖葉可青儲。

(五)大豆渣亦可作牛的飼料。(李登元)

防治法：

①病園土壤需行土壤消毒。雨季期間(每年八、九月)需噴「猛乃浦」八〇〇倍稀釋液。

②採果後，用四〇%「腐絕」(TBZ)可濕性粉劑五〇〇倍稀釋液加明礬〇·五%，浸三分鐘，陰乾後儲藏之。(蘇鴻基)

金魚疾病防治

〔問〕：(一)金魚雌雄如何辨別？各有什麼特點？

(二)金魚需養多久才可配對繁殖？比例是多少？

(三)何時產卵？一年產卵幾次？

(四)有什麼疾病？如何治療？

(五)鱗片脫落有何影響？會再生長嗎？(台北市齊東街九〇巷一弄五號洪建中)

〔答〕：(一)金魚到產卵期，雄魚的鰾蓋及胸鰭等處，會出現白色角質的追星。


又成熟的雄魚，輕壓腹部會有白色精液流出，由此可與雌魚區別。

(二)金魚一般滿一年就可配對繁殖。

雌雄比為一：一或一：二。

(三)金魚產卵期多在春季(水溫攝氏十八、二十度)。

一年一般產卵一次，有時二、三次。



農友，林友們的福利！

本公司擬採購各種果核及樹仔子，請將樣品各種數個，每公斤售價等，直接寄來本公司選購(因部份果核不能使用)，經本公司認為可採用者，另再連絡交貨上的細則。

寶島果核工藝股份有限公司

台北市迪化街一段二八八號 電話：544078

〔疾病及治療法：〕

(1)魚虱：用「地特松」五十萬分之一濃度，潑洒於池水。

(2)針虫：冬天池底用生石灰消毒，日光曝曬，同時使用一百萬分之一濃度的「地特松」，潑洒於池水。

每隔六、七天施放一次，連續四、五次。

(3)水生菌病：用「孔雀綠」三百萬分之一濃度，潑洒於池水。

(4)鰓腐病：與水生菌病同。

(5)尾腐病：一升水加五千單位的盤尼西林，病魚放入其中施行藥浴。

(6)立鱗病：移放較高溫(攝氏二十五、三十度)的池水中蓄養，其間中止給飼。

(7)鱗片脫落嚴重的，會導致死亡。(彭弘光)