

(三)有機汞劑中毒及治療法

(1)中毒症狀：接觸濃厚的有機汞劑時，皮膚極易形成輕度潰瘍而感疼痛。吸入中毒者，會引起腎及肝臟機能障礙，發抖為慢性中毒的特徵。

(2)治療法：皮膚炎通常塗擦軟膏，使用 BAL、Cysteine thioctic acid 等 SH 解毒劑。

(四)勃拉益斯中毒及治療法

(1)中毒症狀：施藥一、六小時後即發病，引起眼臉炎、結膜炎、角膜表皮剝離、角膜白濁(如再感染細菌時，便引起角膜潰瘍)，症狀為眼臉腫脹、流淚、頭痛、眩暈。

(2)治療法：角膜障礙者，施用維他命B₂，尤其用B₂(FAD)劑之點眼或軟膏為佳。角膜治療後或輕症者，用氫化皮質類軟膏治療。

(五)POP 中毒及治療法

(1)中毒症狀：接觸部位引起皮膚炎症，慢性中毒者(多為接觸期間較久者)呈脫力感，體溫上升、眩暈、大量出汗、虛脫、尿蛋白等。

(2)治療法：
a. 輕症者休息數日，停止作業就可復元。

b. 補給水分及塩類，保持精神鎮靜。

神鎮靜。

c. 注射 APT 或利用冰囊，濕毛巾擦拭身體或用電扇扇風降低體溫。

(六)有機氟素劑中毒及治療法

(1)中毒症狀：誤飲或自殺者，會劇烈嘔吐，有吐出茶褐色液體(胃粘膜出血)，胃部疼痛，意識逐漸混濁，並引起癱瘓樣痙攣(有者吐口沫)，而陷入昏睡狀態。常發生強直性痙攣，脈搏不正常，血壓下降而死亡。

(2)治療法：洗胃後給與硫酸鎂及活性炭，心臟障礙者用 Procainamide 靜脈注射(五〇〇毫克溶於 Glucose 500cc)而行魚滴靜脈注射。

(七)有機磷劑中毒及治療法

(1)中毒症狀：口服中毒者，會下痢、腹痛、痙攣、嘔吐等。

(2)治療法：注射 Sodium Thio-sulfate, Detoxal, Plasgen L, Hypon 等藥劑。



有機磷中毒後向某會或衛生所申領巴姆解毒劑急救(林佑卿)

既有效、又安全的水田殺草劑

理研 殺滅丹 粒劑



對水田稗草、學菜等一年生雜草及牛毛氈、三角草等具有優異的殺草效果。



理研藥販株式會社

總代理：靜興企業股份有限公司

總經銷：衆益化學工業股份有限公司
中壢市五權里中正路1043號