



農業信箱

蜂羣盜蜜

〔問〕：(一)蜂羣盜蜜，應如何防

命，用來飼蜂是否可以？

〔答〕：換取新王最遲期限為何？

〔問〕：介紹有關養蜂新書？

〔答〕：蜂最喜歡採什麼花？(西螺鎮鹿場里九三號邱溪泉)

〔答〕：(一)白天盡量少開弱羣的蜂箱蓋，以免箱中甜味外洩，引起強羣蜜蜂前來盜取。

又飼蜂宜在傍晚，如此，可避免盜蜂。

(二)糖可代替蜂蜜當蜜蜂的食物。

花粉是蜜蜂所需維他命之來源。自來水只要清潔無菌，就可以使用。

(三)換王並無一定期限，但通常春夏較易成功。

晚秋及冬季，因氣候較不適於蜂王交尾飛行，同時雄蜂數量很少，交尾不易成功，使換王略為困難。

(四)范宗德先生著有一本「新養蜂」，請逕函后里仁里村七鄰永興路八號之三洽購。

(五)流蜜量多的花，蜜蜂較喜歡採。(會建民)

驅牛虫藥

〔問〕：(一)如何配製「牛

猪安」為注射液？治狗濕疹，

秃毛疹應注射多少？

(二)反芻動物驅虫藥，何種

效果最好？

(三)鹿身上創傷，經數年未

愈，型如一元硬幣，由爛肉中

常分泌出類似血液液體。

經塗用硝酸後脫落一塊硬厚皮，

用何藥物能促使封口？(宜蘭縣立蘇

澳國中周開先)

〔答〕：(一)牛猪安有口服(混於

飼料中)及外用二種。並無配製注射

液的方法。

至於你所述的狗濕疹、秃毛疹等

症，應請有經驗獸醫或送至台灣大學

附設獸醫院門診處(台北市基隆路三

段)檢查診斷，再給藥治療，不可自

己亂用藥物。

(二)反芻獸的內、外寄生虫種類很

多，並非一種驅虫藥就可驅除所有寄

生虫。

如「牛猪安」，可用為治療牛外

寄生虫虱(用法請照藥廠出品說明處

理)。

牛蟲用二%「魚藤精液」或五%

「B·H·C」溶液，噴洒牛體。

牛的内寄生虫以肝蛭為患較多，

用「六氣乙烷」治療有效，成年牛一

次量一〇〇克，犢牛五〇克。

(三)脫落一硬厚皮，可先用過錳酸

鉀溶液(呈深紫色)沖洗傷口，然後

再用消炎軟膏，或抗生素軟膏塗抹傷

口，可使傷口惡化而漸癒合。(李登

芳樟扦插繁殖

〔問〕：(一)芳樟扦插繁殖中所用

插穗的老嫩程度應如何？

(二)是否需要帶葉？

(三)管理要點如何？

(四)成活率如何？

(五)較用種子繁殖，何者成長較快

？(南投縣國姓鄉長流村天遠山莊王

德文)

〔答〕：(一)芳樟的插穗，可採自

造林木的滿一年生枝條，或滿一年生

出栽苗木的基幹部。

(二)插穗不需要帶葉，長度宜剪為

二十公分左右，直徑一至一·五公分

為合格。

(三)管理要點：

(1)扦插時期以二月下旬至三月中

旬為宜。

(2)採取枝條後，應迅即包裝運回

，插穗應當天就扦插。

(3)扦插方法有直插與埋幹兩種。

直插法應將插穗全長的一半至三

分之二插入土中。

埋幹法則將插穗平埋於土中，覆

土約三分公。

(4)插後以手壓緊，並蓋稻草，架

設蔭棚，保持濕潤，以後隨時注意灌

何為宜。

(2)採取枝條後，應迅即包裝運回

，插穗應當天就扦插。

(3)扦插方法有直插與埋幹兩種。

直插法應將插穗全長的一半至三

分之二插入土中。

埋幹法則將插穗平埋於土中，覆

土約三分公。

(4)插後以手壓緊，並蓋稻草，架

設蔭棚，保持濕潤，以後隨時注意灌

溉、除草、中耕、施肥等工作。

(五)成活率：直插法約六十%，埋

幹法約七十~七十五%。

(六)種子繁殖與插條繁殖，生長成

績相差不多。但種子繁殖得苗率高，

成本較低；插條繁殖則因能遺傳母樹

的性質，可獲純種的芳樟苗，為其特

徵。(林文鎮)

賺 錢 秘 訣 植物活力素 保證 滿意

美能露

(MENEDAEL メネデル)

功 能

促進發根發芽生育，轉弱為強，必使作物，
提高品質，增加收成，早期出貨。

(1)苗 圃：施噴溶液，可促進強根，育成健苗，
提早出貨。

(2)移 植：施噴溶液，成活率百發百中，萬無
一失。

(3)葉 面：施噴溶液，可助長發育，強化鮮度，
增加收成。

(4)結 果：施噴着果部位，可增大開花結果，
防止落果，促進成熟。

(5)結 實：施噴原液可同生強化，恢復結實，
旺盛結果，多獲生產。

(6)結 實：施噴原液可同生強化，恢復結實，
旺盛結果，多獲生產。

台灣總代理

旭輝企業股份有限公司

台北新莊新莊路565巷8弄3號 電話：908648

定價：100cc裝75元 500cc裝310元 2立裝860元

(說明書備索來函請註明「豐年」字樣)

惠顧：請向各大農藥肥料種子行藝花店購用，或向

郵政劃撥儲金第 18502「謝旭垣」帳戶訂購