

## 羊齒植物在園藝上的利用

很多羊齒植物厥類在森林中自然的生長成叢林狀，我們可把這些羊齒類移植到我們的庭園中來。它們有很多品種，從很低矮的只有數英寸高的，直到像樹木一樣高的都有。

它們最大的優點就是很容易培植，並且可供園藝上作多方面的用途。在晚冬或早春種植羊齒植物，可使它從泥土中得到較多的水分。像秋海棠、櫻科植物和好酸性灌木所要求的土壤，也可適合它生長。在野外含有很多落葉腐植質的沃壤、壤土、和有煤層的池沼地，都是很好的羊齒類生長地帶。

羊齒類的根所需要的空間很大。栽種時讓它們的葉梢稍為接觸，但不要使它們重疊交織在一起。有些羊齒類的根可伸展至三尺或更多。不要把它們種得太深，因為它的根只適宜伸展在泥土表層數英寸的地方。

大多數羊齒類較喜歡生長於遮蔭地，但某些產自阿爾卑斯山的小厥類例外，它們也可生長於開朗光強的地方。由於生長環境不同，所以須要的水分量也不同。

在庭園中設置能供羊齒植物生長的遮蔭地帶，可種植劍蕨、孔雀草或其他羊齒植物——它們會緊密的生長於此地帶中，且將不會長出此地帶之外而遮蔽了其他景色。

或者把羊齒植物種於溪流邊的陰暗處，可與櫻草花或虎耳草間種。

如果把羊齒種於樹底下，可得到像稀鬆地毯般之效果，或者把它們種於花園和樹木之間，作為一種過度植物。或是以其葉子來作為一種對比，纖細錯綜似花邊的羊齒與別種寬大或窄狹的葉子相映成趣。

我們也可看到羊齒類能很有效地成為「懶人的庭園植物」(註)。

羊齒類也是很好的盆栽植物，將數株種於盆

中再放置於遮蔭處中。但開敞的地方，或將它們羣集於有遮蔭的台地上，再間置以盛開花兒的盆栽八仙花或球根海棠。

有一點要注意的就是羊齒類植物生長於盆中其根部需要充足的空間，所以當你換盆時，所用的新盆要比原來的大兩倍以上才行。

註：意思是種下後可不必或很少去管理它而任其生長。

余天民譯自 Basic Gardening Illustrated.

羊齒植物(呂福和)



足的水分，

每日澆水一

二回，冬

天的澆水次

數可以酌減

，每一二

日一回即可

。但是要注意

在花蕾初

形成的時候

，水分應該

略加限制，

稍為保持乾

燥，否則花

蕾容易脫落

。很多人種

了蟹爪仙人掌不開花，常常是因為在這個時期澆水

過多，以致花蕾脫落的緣故。


從花期後到開始再生長前這段時間內，水分也可以略為減少。如果能夠把握住這兩段乾燥時期，那麼你差不多就可以擺張椅子坐以待花了。不過這裡所謂的乾燥，僅是指水分程度上的減少，千萬不能乾燥到使枝條發生枯萎。蟹爪仙人掌適合在半日陰下生長，光線太強的時候會使葉子燒焦，失去觀賞價值。

至於施肥，可以用充分腐熟的稀薄豆餅液或稀薄的 Hyponec 液每一二周施用一次，也有人將腐熟的豆餅搓成湯圓大小，埋在盆子的三個角上，每一二、三個月施用一次。施肥不足時植株容易老化，莖節會紛紛脫落；施肥太多時，雖然植株生長旺盛，但容易引起病害。

蟹爪仙人掌在高溫多濕的環境下較易發生病害，一般以根腐病最為嚴重，植株由接近地面處開始腐爛，此病可施用大生預防，但最好的方法還是土壤消毒以及改善栽培環境。

以上蟹爪仙人掌的栽培管理雖然談得很多，但

仍然只是原則而已，至於其中三味恐怕如人飲水冷暖自知，需要自己動手去栽培後才能體會得出來。



採取神德