




V-9

葉面撒佈劑 含有特殊金屬鹽的微量要素



V-9之使用說明

作物名	撒佈時期	目的	稀釋倍數
水稻	分蘗期(除草後)出穗前	促進生育(三次)增加數量(一次)	1000倍
柑桔、果樹類	發芽時後 結果時後 收穫時後	充實發芽 防止落果、促進果實肥大增加糖分 樹勢回復	1500倍
茶	發芽時後 摘葉時後	促進與充實發芽 補給營養	1000倍
菸草	育苗中後 定植中後	健苗育成 防止立枯	1500倍
葡萄	新梢伸長期前 ~開花後 ~收穫後	新梢伸長 防止落葉 樹勢回復	1000倍
草莓	苗定植時後 收穫時後	健苗育成 促進生育與肥大 延長收穫期	1500倍
胡瓜 西瓜 南瓜 蕃茄	育苗中前 定植中前 定植後 收穫前	健苗育成 補充營養 增加耐病性、促進生育 增加收穫	1500倍

作物名	撒佈時期	目的	稀釋倍數
洋蔥 白菜 甘藍	育苗中前 定植前 定植後 生長肥大期	促進生育 補充營養 促進著活、增加耐病性 促進結球肥大	1500倍
蘿紅 蘿蔔 牛蒡 甜菜	3-4葉期 疏苗後 根部肥大期	促進初期生育 促進生育 增加耐病性、增加收穫量 子防內部黑點、腐心	1500倍
落花生 大豆 大小豆	育苗中(3-4葉期) 開花前	促進生育 育大根端肥大	1500倍
馬鈴薯	6-7葉期 開花數日前	促進生育 增加收穫量、預防病害	1500倍

種子浸漬法

作物別	稀釋倍數	浸漬時間
稻、麥	1000倍液	5-8小時
柑桔、果樹類	1000倍液	5-6小時
蔬菜類 油菜類 甘藷、豆類	1000倍液	2-8小時

現貨供應：**彰和農藥行** 嘉義縣義竹鄉六桂村199號 電話：義竹24·57
旭豐農藥行 雲林縣虎尾鎮東仁里福民路42號 電話：虎尾148