



談養兔

北斗鎮斗宛路 231 陳長水

養兔實為農家的一種好副業，我個人養兔至今已三年多，現將個人經驗敘述如下，供大家參考：

養兔首先必須建舍造巢，兔舍應時常保持清潔乾燥，兔籠的設備須合乎衛生，通風設備宜良好，但不可使家兔受到直接或由隙縫吹進來的風。

養兔成敗的關鍵在於兔種的選擇，家兔可分為大、中、小三種。大型兔有大型佛來米希白兔、大型花斑兔、大型日本白兔；中型兔有紐西蘭兔、美國錦企蘭兔；小型兔有荷蘭兔、英國兔、喜馬拉雅兔；另外還有毛用的安哥拉兔。

家兔的管理大約可分為日常管理，仔兔管理以及季節性管理。首先談談日常管理：養兔飼養必須次數一定，時間固定，食物分量也需依兔的成長遞增。

早晨必須調配飼料，觀察兔的舉動，如有發生疾病的兔應行隔離治療，兔舍也應在此時清掃。中午必須巡視兔舍一遍，如供給飼料，應以青料

為主，精料少量即可，在此時也要為兔子加水。晚上是兔子最具活力的時候，飼料應較早晨中午略增。

仔兔的管理可分為哺乳期的管理和離乳期的管理。

(一) 哺乳期的管理：生產巢必須保持清潔乾燥，必要時須保溫，尤其是冬天所生的仔兔特別需要。剛出生不久的仔兔，必須放在一起，如此可避免被母兔壓死。

哺乳期的母兔應盡量避免驚擾，放於生產巢中的東西，可用較軟的材料，最好是放一些棉花，免仔兔凍死。

(二) 離乳期的管理：仔兔離乳時應以中午為佳，但仔兔不可同時離乳，應從較壯的仔兔先離乳，約一天兩頭為宜。

仔兔離乳後一至二天每天給予飼料六次，三至五天每天給予飼料五次，六至三十天每天給予飼料四次，一個月以上每天給予飼料二、三次。如此飼養了四個月就必須將雌雄分開飼養，一籠以一頭為佳。

季節性的管理可分為春、夏、秋、冬四季來談：

春季：供給食物應適量，如過量則會發生過食現象。二月至四月可生產兩胎，一般哺乳期為四十至四十五天左右，而此時可縮短為三十五天。

夏季：可分為梅雨期及酷暑期。梅雨期：兔舍應保持乾燥，不必給水，飼料應給予較少水分的飼料，青料應先曬乾；兔舍周圍洒些消毒劑，應特別注意食物是否發霉。

在此時家兔最易感染上球虫病，其治療方法很簡單，可用道氏球虫粉

，陶氏球虫粉及磺胺劑混於飼料給食，即可根治。

酷暑期：於六至八月間，此時容易引起家兔中暑。其預防方法可在兔舍周圍加上防熱器，並在兔舍周圍裝上紗窗以防蚊蠅。此時兔有食慾不振，可在食物中加些茶葉渣。

食物腐敗應予清除，若發現有呼吸困難的兔則須加水。且除了必要時應禁止交配，也必須存藏乾草以備冬用。

秋季：此時交配頻率提高，換毛期約在十月左右，應禁止交配，在這段時間是家兔生長最迅速的時期，飼料量應比他季稍增。

冬季：將種兔以外的兔賣掉，因此時家兔剛換完毛，是家兔最富價值的時期。

兔成長了，接着的工作就是繁殖，家兔的繁殖適齡約於出生後六個月至四年間，超過四年的種兔繁殖力減退應淘汰。

家兔的發情有下幾種現象：情思敏切，見人跳躍，抓弄兔籠，食慾減退，陰腔潮紅，體毛光澤，眼放神光，陰腔分泌異味。

兔子發情，正是配種的好時機，應趁著此時交配。家兔的配種方法有三：自然交配，人工輔助，人工授精。交配時間應於早上七至八時，晚上八至十時，但不可在中午交配。

家兔交配後三十二天就可生產，母兔在分娩前會有幾種情況，例如會做巢，情緒不穩定，抓床板，拔毛，陰戶腫大。

母兔在分娩時，千萬要避免貓狗進入兔舍，否則母兔受到驚擾，會有吞食仔兔的現象。母兔分娩後約半小

時，應給予水和較易消化的食物，如含有缺皮的飼料。在母兔生產後一星期內不可將生產巢破壞，如此可穩定母兔的情緒，有利於仔兔的成長。

兔的適用飼料甚多，以充分利用青飼料為主，可利用豆科牧草的營養多，熱帶葛藤，山球豆以及禾本科的狼尾草、吉利草、南非鵪草。至於甘藷、蔬菜葉、木瓜葉、花生藤等也可，但不可使偏食，應供給混合飼料，以補充營養不足。

但有一點須特別注意，就是千萬不可以土香給食，如家兔吃了土香，會死亡。

青飼料量可用總量的八五%，其餘以精料補充。精料的調配法可以用黃豆粉三三%，玉米粉三三%，麩皮三三%，食鹽一%的混合飼料給食即可。

此外，須經常檢查兔的健康情況，家兔的正常狀態：體溫三九.三度C±0.五度C，脈博每分約一二〇~一四〇次，呼吸每分約一五~三〇次。

青料給食時不可含有露水，因露水中含有微生物和原生動物，家兔食後會發生下痢。

兔舍一年必須全面消毒兩次以上，方法有二：一是用肥皂洗刷，再經日光消毒。

另一種是藥品消毒，可用石碳酸三~五%，複方煤油粉一~三%，氫氧化鈉二%或用生石灰消毒。

