

農友經驗



春作大豆收益高！

屏東里港鄉潮厝村72號許基祿

大豆是高屏地區最主要的農作物之一，尤其是利用烟葉收成後，種春作大豆，利益最高。

下面是我種植百米大豆的經過，提供給農友們參考：

(1) 整地播種
通常播種適期為

二月上旬至三月上旬，我所種植的日期是在烟葉收成後的二月中旬，品種為百米大豆。

在烟葉收成後，即時將烟草殘莖去除，行整地後全面灌水。

隔日用半犁挖成播種小溝，行間三十六公分，深度四公分。

可用播豆機播種，每穴二粒，株間十二公分，每分地播種用量是九台斤。

(2) 施肥管理

播種的同時每公頃用四〇〇公斤過磷酸鈣做基肥，事先條施在播種的小溝中，然後播種、蓋土。

發芽後十三日左右，用小型的犁把除型畦間雜草，做第一次的中耕除草。

三天後型倒的雜草已經枯死，可灌水一次，十天後再行第二次中耕除草兼大培土，每公頃施用七〇公斤尿素做追肥。

其施肥方法是施肥前一天做全面灌水，隔日才用散施方法全面施肥，然後用犁把培土。

大培土看土壤乾濕情況再灌水，普通是每星期灌水一次。在開花期或結莢期千萬不可讓土壤過於乾燥，以確保豆仁飽滿。

(3) 病虫害防治

大豆發芽後一星期內為避免發生線虫害，我就用五〇%大滅速乳劑加水一、〇〇〇倍，噴射一次。

播種一個月以後，每一星期噴射錳乃浦(大生四十五)加水四〇〇倍，同時混合五〇%速滅松乳劑加水一、五〇〇倍，以防治豆莢蠅及銹病發生。

到了開花凋謝、豆莢開始形成時，改換噴射四十七%巴拉松乳劑加水八〇〇倍，混合五〇%速滅松乳劑加水一、〇〇〇倍，以防治椿象類、蚜虫及紅蜘蛛等害虫發生。

開花凋謝後約二十日左右，大部分已經結莢，為防止豆莢蛆及椿象害虫發生，可用五〇%速滅松乳劑加水八〇〇倍噴射一次。

所以，在生長期間豆葉沒有被害虫咬嚼的現象，我的大豆收量每公頃二、四〇〇公斤。




農藥登記證經市製字第107號



福賜培 乳劑

ホスベル E.C.

稻熱病



- ① 福賜培(ホスベル) 使用於水稻，不但可防治二化螟蟲、稻縱捲葉蟲、稻苞蟲，並可同時預防稻熱病。
- ② 福賜培(ホスベル) 使用於蔬菜，對夜盜蟲、小菜蛾、青蟲等鱗翅目害蟲有特效。
- ③ 福賜培(ホスベル) 為有機磷劑之低毒性者，毒性比巴拉松、EPN、固殺松等為低。
- ④ 福賜培(ホスベル) 使用後絕無藥害。
- ⑤ 福賜培(ホスベル) 使用後，絕無殘臭等。

美國 VELSICOL CHEMICAL CORPORATION 提供
國豐化學工業股份有限公司 榮譽出品