



秋海棠多姿

球根繁殖最容易

• 笙 戀 •

近年來由於園藝家對育種工作的不斷努力，原有的秋海棠品系陸續的被改良，新育成的品種源源的發表，不論觀花或觀葉種，已不勝枚舉。

秋海棠色彩富奇性，花型變化最多，除了紫藍色系統缺如外，其餘都具備。花型多變，配上植株型態的多姿，自然構成引人注意的媚力。

秋海棠原產南美洲，具扁平塊狀根莖，為低溫休眠性球根，耐寒性低，但生長溫度也不能過高。

常用的繁殖方法有下列四種——

球根：以此法最為簡單，也最容易成功。將秋海棠球根杯狀形的一端向上，置於水苔、蛇木屑或河沙中保持濕潤。溫度控制在攝氏二十度，直到紅色小芽點出現後，再覆以水苔或蛇木屑，蓋過球根，厚約一—二公分，輕微澆水，待葉子出現，則給予充足陽光，但須防直射。一個半月即可上盆。

分球：將球根置於沙中，保持濕潤，行催芽作用，等小芽長出後，依球根的大小切成若干塊。定植前傷口消毒，或稍行陰乾，以防腐敗。

芽插：選擇健壯植株上的充實側芽，長度約五—六公分切下，插於水苔、沙中，插入深度約插穗的三分之一。充分澆水，天氣暖後七—十天即可發不定根。

播種：由實生苗栽種到開花，時間較長，且花費的工夫也較多。但實生法在育種上可選出優良的園藝新品種，因此如欲改良品種，採實生法最有效。

球根秋海棠由實生苗經過一段時間的栽培後，也可得到小塊球根。播種用土以孔徑〇·五公分大的

篩子篩過，填入播種用淺盆，另盛一些於紙袋中，放入烤箱中，以攝氏八〇度消毒三〇分鐘。消毒時，溫度計插入土中，隨時注意保持所需溫度。

消過毒，等冷卻後，整平盆土表面，並稍為壓緊，用細孔噴水壺充分澆水，讓多餘水分排出。再將盛在紙袋中的土鋪蓋盆土表面，使盆土形成薄的鬆土表，易於嫩根伸入吸收。

採撒播法播種，將種子均勻撒於土表，不用再覆土。淺盆放入塑膠袋中，袋口用橡皮筋縛緊，勿使塑膠袋與土面接觸，並切斷氧氣供應。如此土中含有的水分，吸熱形成蒸汽，而蒸發出來，遇到冷的塑膠袋，凝結成水滴，再落回盆內，即可保持濕度。攝氏一八度—二〇—二四度即可發芽，保持在二〇—二五度，發芽更快。

剛發芽的小苗成綠色小點，不易察覺。此時必須接受充足日照，仍須防止直射。袋內空氣受熱，溫度升高，可促進植株發育。

小心管理，促進生長：小苗在袋內因水滴滴，得保有水分而生長。第二個月本葉已長出，可打開袋口，切忌盆土乾燥。

適宜的溫度、光線、水分和濕度，可使植株生長良好。若在生長期最初六個月，這些影響因子中缺少任何一項，足可引起組織早熟硬化，植株就無法發育完全，要詳加注意。

本葉二枚時，行第一次移植。培土須通氣良好，保水、保肥力強，以腐葉土、腐熟乾燥牛糞及田土混合調成。以每株距離五公分種於淺箱或盆內，深度以不超過原來生長深度為限。移植時帶母土，避免傷及根系，移植後生長快速，待葉子已充滿盆面時，定植於五英寸盆。

保持二十度的生長溫度，在花芽形成時，如能降低溫度一度，則可使開花更大，花期延長。

球根秋海棠因莖葉多汁，所以空氣濕度在幼苗期不可過高，以防地上部腐爛。

栽植位置需遮蔭，防陽光直射。如能以木條搭成蔭棚，調節適當光度透入，也可促進通風。當然盆栽更好，下垂性種更可掛於近木條處，讓花梗自然下垂，增添幾許嫵媚。

大部分球根秋海棠屬夏開種，也有冬開種。夏開種為長日照植物，需要十三小時以上的光照才能着蕾開花，只有在四—九月才能得此充足日照時數，除這幾個月分外，自然環境下就不能開花。

如植株生長已到相當高度，可行長日處理，以促進開花。晚上十點三十分至早晨一點三十分止，作連續三小時的燈光照明。或以自動控制器，入夜後每半點鐘亮光六分鐘，效果一樣。

短日種在長日照下不能開花，下午六點後用黑布罩在植株，至早晨太陽升起前除去，行短日處理，即可促進開花。

通常在二月播種初夏開花。以球根繁殖或芽插者，管理參照上法。秋播者，如在今年內不開花，儘可能延長其生長期，肥培球根攝氏七度即可越冬，第二年花開良好。植株在開花後，等地上部枯黃，可將球根掘起，陰乾後儲藏，第二年再行種植。

球根秋海棠只要植於適當地方，能得到早晨半天日照、排水良好、給予充足養分，甚至花壇都可栽植。美麗的下垂性種不論在室內或花棚中，都顯出她的超然不俗。