



白火雞怎樣飼養？

唐清岑

白火雞是貝茨維爾小型白色火雞的簡稱，是美國農部在馬里蘭州貝茨維爾鎮的農業研究中心經十七年的研究才育成的。牠的特性是全身毛純白色，體態健壯優美，早熟，六個月即可上市出售，比一般火雞提早二、四周，此時的體重公母平均約為十台斤，飼料利用效率好，很能適應本省的飼養環境，目前本省各地都有人飼養這種火雞。

母火雞七個月齡至八個月齡時可與公火雞配種，配種後二、三周即開始產蛋，一隻母火雞平均第一年約可產八十個蛋。如要留作種蛋，每枚以七十五、八十公分為標準。每年十二月至翌年六月間是火雞盛產時期，母火雞每年約產四窩，每窩約二十枚蛋。在產蛋期間，為保持良好的受精率，公母比例為一隻公雞配十二、十五隻母火雞。

火雞開始產蛋後，管理人員每隔二小時需收蛋一次，以保持種蛋的新鮮和清潔。蛋收集後如沾有污物，應用沙紙或刷子拭乾淨，而後把種蛋大端向上豎立在蛋盤上，並盡量存放在空氣流通陰涼的地方，存放時間不要超過一星期。

火雞可由母火雞自行孵化，每窩可孵十五、十八枚蛋，也可用孵卵器孵化。孵化期間每天需翻蛋四、五次，孵化後一星期需照蛋，把

無精蛋檢出，孵化至二十四天再照蛋一次，把中止蛋檢出並把蛋移到發生盤。照蛋方法和孵雞蛋檢蛋法一樣。

孵化期中所需溫度，前二十四天需華氏九十九度、一〇〇度，相對濕度需六〇%，最後四天溫度為華氏九十七度，濕度為七〇%，火雞蛋的孵化期間為二十八天。

開始 始育雛前一星期需把育雛器及有關的器具洗淨消毒妥當，在入雛前一天把所需溫度調節好。火雞雛孵出後如不輸送即可移入育雛器內，並開始供給水。孵出後的火雞雛因腹內尚有未吸收完全的卵黃，因此不需馬上給飼料，待腹內的卵黃吸收完全後約需三六、四八小時，再把少許飼料放在紙上讓火雞雛啄食，待學會吃料後再把飼料放入飼料槽內。

育雛期內需保溫，冷天需四周，熱天需二周以後就可廢溫。火雞雛在三周齡需接種雞痘疫苗，在腿部外側拔去一小塊的羽毛，用小刷子沾痘苗在拔去羽毛的地方輕輕的磨擦，使出血而不流血的程度即可。

種痘 痘後需檢查是否出痘？如果沒有出痘必須再種一次，直到出痘為止才有預防效果。四周齡時實施新城雞瘟及家禽霍亂預防注射。

八周齡後火雞逐漸長大，此時即可放牧，管理上就粗放了，白天把牠們放出，晚上趕入火雞舍即可。放

牧時應注意：①除供給飼料外，需再給飼料量三〇%的青飼料，只要是綠色，火雞肯吃的農作物副產品皆可節省飼料費。

②四個月齡時，需再實施新城雞瘟及家禽霍亂預防注射，並把公母火雞分開飼養。

③六個月齡時火雞即可出售。如要留種可在此時選種，選擇各部位正常，體態健壯，平均體重公火雞五、五公斤，母火雞四公斤以上，且公的體重不要超過母的二倍以上者。體型欠佳者不可留為種用。

選留 的種火雞繼續公母分飼，至七月齡時再實施

第三次新城雞瘟及家禽霍亂預防注射，然後以公一隻母十、十五隻的比例趕入產蛋舍。

產蛋舍內需鋪墊料，墊料以切斷的稻草、粗糠或木屑均可，並需準備產蛋箱。每四隻母火雞共用一個產蛋箱，蛋箱可用魚箱墊以粗糠或稻草，放在較陰蔽的地方。


火雞趕入產蛋舍同時開始人工點燈。平均七個半月齡時才可開始人工點燈，可增加火雞產蛋量二十五枚，提早三〇天產蛋。每一〇坪地面用一〇〇燭光燈泡一個，燈泡掛在距地面一、八公尺高處。

點燈時間及日照時

間加起來需十四小時，但不得超過十五小時，以定時器調節可省人工，且較準確。

火雞 雞所需飼料可用雞飼料代替，自孵出後至八周，飼料中所含蛋白質為二八%，九、十六周為二五%，十七周以後為一五%，種火雞為一六%。

農 牧局為獎勵坡地農戶利用果園，或水土保持種植的覆蓋牧草飼養白火雞，多年來曾補助山坡地農戶飼養白火雞，成效很好。因此白火雞是一值得飼養的火雞，農友如有意飼養，可向省畜產試驗所高雄種畜繁殖中心（鳳山市王生明路八五號）訂購。（台視「快樂農家」播出）



白火雞飼養