

# 拖鞋蘭花朵奇巧美麗

陳榮府

拖鞋蘭一般人喜歡叫「喜普」(Cypripedium)，以前稱它為「熊谷蘭」，英名是「愛神之鞋」(Lady's slipper)。「愛美女神」是帶着文藝色彩的美名，一般植物學者管它叫「芭菲爾鞋蘭」(Paphiopedilum)。

而近代植物專家們，却非常細心的把它分成四種屬別：喜普鞋蘭屬(Cypripedium)、芭菲爾鞋蘭屬(Paphiopedilum)、鬍拉密鞋蘭屬(Phragmopedium)、西麗妮鞋蘭屬(Selenipedium)。

雖然拖鞋蘭擁有那麼多稱呼，但在本省許多愛花者的心目中，很少知道它的存在，或只有耳聞或書本中偶而看到。抑或不敢嘗試栽培，怕不如嘉德麗亞蘭、石斛蘭、蝴蝶蘭或喜姆比地蘭那樣普遍，到處受歡迎。

目前本省已經引進不少的拖鞋蘭原種及交配種，其花葉過於美麗，實

難以文字加以形容。栽培方法很簡單，茲將其方法簡單介紹給愛花的農友們。

## 可分四大屬

**喜普鞋蘭屬**：原產於歐洲中部、北美洲以及台灣中央山脈。是一種球根植物，每年秋冬季地上部即枯死，春後萌發地上莖，莖短生兩葉。花期約在四至六月間，需要冷涼氣候，本省平地不易栽培。

**芭菲爾鞋蘭屬**：一般所栽培的拖鞋蘭以本屬為主，原產於印度馬來西亞及我國。常綠無莖，葉革質，花極



拖鞋蘭

美，目前的交配品種都是本屬。

**鬍拉密鞋蘭屬**：原產於哥倫比亞、秘魯及中美洲一帶，常綠無莖，葉長革質，花莖多分叉。往往一株能着生許多花，且其花瓣狹長，有如鬍鬚狀，因而得名。

**西麗妮鞋蘭屬**：原產於南美洲，是唯一的高性種，其形態和鬍拉密鞋蘭屬極相似。

如果依照栽培管理的需要，可概分為兩種——

**溫暖型**：一般拖鞋蘭的斑葉種都屬於此型，其葉有各種美麗而不同的圖案斑紋，有些恰似水晶宮裡觀音般，閃爍發光，有些如大理石紋狀，使人看後涼爽適暢。

本型較喜好溫暖氣候，休眠期不明顯。多數品種的開花期在夏秋間。本省氣候非常適合它的生長，不需增加任何設備，只要多加些遮光即可。

**冷涼型**：綠葉品種大多屬於本型。夏季高溫期休眠，此時要注意加強遮蔭，使栽培環境陰涼，就可以有很好的成果，並不需要其他降溫設備。本型花色極為鮮艷美麗，花型大，是目前交配種的始祖。

拖鞋蘭的花，有黃、紅、綠、褐色，以及數色混合的斑點或斑紋花，真是多采多姿，是各種蘭花所望塵莫及者。尤其那如拖鞋狀的舌瓣，更是奇巧美麗，還有一種鬍拉密鞋蘭屬裡的，它的一對花瓣可長達五十公分，就有如兩條少女的髮辮，美妙極了。

## 栽植·管理

**栽植材料**：拖鞋蘭喜好冷涼而多濕的環境，有人單用水苔種植，成績

不錯，但因栽植成本較高，且材料容易腐敗，必須時常換盆，所以用三至四分的水苔屑，混合水苔六至七分種植最理想。

**澆水**：全年都需要大量的水分，要時常保持盆內材料的濕潤，為使盆內的滯留空氣與水分能徹底交換，要每天早晚澆注一至二次多量的水。如夏季午間日光過強烈時，可使用噴霧器噴灑葉面，以保持濕度，並使環境溫度降低，增加涼爽。

**栽培環境**：拖鞋蘭不喜歡強光，要選用遮光較多的場所栽培，如利用嘉德麗亞蘭棚下層，或使用栽培蝴蝶蘭的場所，反正要比石斛蘭或嘉德麗亞蘭有更多的遮光才行。不然就要在一般的蔭棚裡，增加一至二層的塑膠網，以適合其生長環境，但其擺設地點不能直接置於地面，要吊起或置於鐵線網棚架上。

**栽培移植適期**：拖鞋蘭開花後，就可實行分株移植或換盆工作。如恰遇夏天氣溫漸高時，新植株可能因新根發育未完全，抵抗力弱，容易枯死，最好任其萌生子芽，等到秋季氣溫漸漸轉涼時，再進行分株換盆工作，如此則成績可更理想。

## 施肥病虫害防治

拖鞋蘭和一般地生蘭一樣好多肥，但要希薄多次使用，可以每七至十日，施用希釋過的腐熟豆餅水，這樣才不致發生肥傷。拖鞋蘭的病虫害發生很少，夏季時通風不良，易造成腐敗致枯死者，可偶而噴用「大生粉」混合「速滅松」一千倍，以預防病虫害的發生。