

室內觀賞植物

花葉具美的紅桐草

路統信

近幾年來，作為室內園藝的觀葉植物，栽培非常流行。胡椒科的椒草、爵床科的網紋草與苦苣苔科的紅桐草，均適合小鉢栽培，為室內裝飾植物中不可缺少之三屬。

在苦苣苔科的觀賞植物中，現時紅桐草似乎不像大岩桐與非洲堇的廣為人所熟知。但是紅桐草花葉並美，生長迅速，又容易繁殖。不論就其花姿觀賞或栽培性質而言，都具有許多特點，是很值得栽培的，因此特別在這裡作一介紹，以供大家參考。

紅桐草的原產地是在中美洲的尼加拉瓜，為多年生草本，株高約在十五公分以內，不會作太大的向上生長。莖多肉質而柔軟，密生白色絨毛，由節間分枝，生出匍匐莖，可以伸出很長。

葉為對生、卵形、多肉質，長可達十餘公分，寬至九公分，葉面多皺，色深綠或帶古銅色，中肋及支脈的周邊淡白綠色，成為左右均稱的斑紋。葉裡淡綠或淡紅，密布白色軟毛，葉緣鋸齒狀。花腋出，開五瓣筒狀水花，花徑約二公分。

葉面極富於變化，葉形與葉色都很美，其葉中肋及支脈的白色網紋與網紋草相似，但葉面較網紋草大，花也比網紋草美麗。

紅桐草的花形與大岩桐相像，花朵較大岩桐為小，但紅桐草花朵數目多，色彩鮮麗，所以顯得格外美麗動人。

匍匐莖自葉腋生出，先端形成幼苗，切取後沙播或水苔中扦插，約二周即可生根。春夏二季生長旺盛，播後兩個月即成母株，可以繼續繁殖。在生長繁茂時，一株親株生出四、八枝匍匐莖，可切取幼苗十餘支，繁殖力強，發根容易，生長迅速。

培養土可以腐植土、河沙及腐熟堆肥混合，紅桐草根系纖細，土質宜鬆軟肥沃。最近有用水苔栽培者，其生長力與用土者並無差別。在室內作裝飾栽培或吊鉢栽培時，水苔的保水力及吸水力強，可免澆水時培養土四澆，而保清潔。

紅桐草好高溫多濕，對溫度極為敏感，耐寒力弱。溫度在攝氏十五度以下時，葉面即顯示微狀，至十度以下，即可致全株腐死。搭蓋蔭棚，避免日光直射及強風吹擊。夏季或在二十度以上的室溫時，實施葉面澆水，保持濕潤。低溫時，水分過多易導致植株腐爛。

作為室內觀賞，施肥宜採用配合完善的無機質肥料，氣溫在二十五度以上的夏季，每周施用一次。二五〇二十度時，以規定量加水五倍以上的稀薄液，每二周一次。二十度以下，即無需施肥。

五、六月間，繁殖甚盛，可以新水苔或培養土，重新換植新株。使用清潔培養土，極少病虫害發生。倘因環境不良而致罹病虫害時，應即切取幼枝另培養新株，並將親株捨棄。花期自春經夏至秋不斷，十一月

以後，氣溫降低，即停止生長。冬季要在十五度以上的室溫中保存，翌年三、四月間氣溫回升，再開始迅速生長。如能在溫室中保持二十度的溫度，並以淡紅色螢光燈照明，雖在冬季，仍能花朵盛開。

觀賞用的紅桐草植物，約有三十七種之多，主要的種有：*Episcia cupreata*, *E. repans*, *E. lineata*.



紅桐草

✱

紫微開花月分從五月到十月，很多人稱它為夏天的杜鵑花。的確，紫微在杜鵑花期過後接棒夏秋花季。如你看過盛開的紫微，就能體會出來。紫微在本省各地均有分布，主要花色是白色、紫色及深紅色。可視栽培環境或興趣選擇喜歡的花色，在庭園可以用點栽、羣栽或排栽等方式美化花園。

紫微：夏天的杜鵑花

陳培昌

紫微盆栽要在春季上盆，萌芽前在分枝基部三、五芽處修剪老枝，形成新樹形，增多花數。盆土中可先混合適量的花卉用複合肥料，並在生長期間施硫酸銨或尿素一〇〇：一五〇倍稀釋液。紫微在通風，陽光充分照射，排水良好地生長特優。對土壤適應性大

✱

E. dianthiflora 等四種，通常最常見的是 *E. cupreata* (右圖)，變種及品種約二十種。

✱

，以富有機質的沙質壤土最適。紫微有播種及扦插二種繁殖方式，在一般家庭容易繁殖。播種：十一月至十二月採蒴果乾燥後收存，二、三月播種育苗，培育至秋季開花。播種方法適於大量繁殖。扦插：過了休眠期剪取較大枝，插穗長十二、十五公分，斜插苗床。農林廳於三年前為發展北部花卉事業，在桃園鎮推行股東式農業經營改善示範區計畫，由新竹區農業改良場負責指導並設置花卉生產中心。去年為響應美化環境運動，大量繁殖各種花色的紫微苗木，廉價供應。如有需要請與桃園市龍安街十二號花卉生產中心接洽。